

# العلوم الـيـئـيـة

الصف الحادي عشر

كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول - الجزء الثاني





سَلَطُونَتُهُ عُمَانٌ  
وَزَانَهُ التَّرْبِيَةُ وَالْعِلْمُ

# العلوم البيئية

الصف الحادي عشر

كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول - الجزء الثاني

مطبعة جامعة كامبريدج، الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة.

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزءاً من الجامعة.  
وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خلال نشر المعرفة، سعياً وراء  
تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

© مطبعة جامعة كامبريدج وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان.

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويحظر للاستثناء التشريعي  
المسموح به قانوناً ولأحكام التراخيص ذات الصلة.  
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على الإذن المكتوب من  
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان.

الطبعة التجريبية ٢٠٢٤ م، طُبعت في سلطنة عُمان

هذه نسخة تمت مواعمتها من كتاب الطالب - العلوم البيئية - الصف الحادي عشر - من سلسلة كامبريدج للإدارة البيئية  
وسلسة العلوم البحرية لمستوى الدبلوم العام والمستوى المتقدم AS & A Level .

تمت مواعمتها من كتاب الطالب - العلوم البيئية - الصف الحادي عشر - من سلسلة كامبريدج.  
لا تتحمل مطبعة جامعة كامبريدج المسؤولية تجاه المواقع الإلكترونية المستخدمة في هذا الكتاب أو دقتها،  
ولا تؤكد أن المحتوى الوارد على تلك المواقع دقيق وملائم، أو أنه سيبقى كذلك.

تمت مواعمتها من كتاب

بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٢٤/٨٣ واللجان المنبثقة عنه



**جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم**  
ولا يجوز طبع الكتاب أو تصويره أو إعادة نسخه كاملاً أو مجزأً أو ترجمته  
أو تخزينه في نظام استعادة المعلومات بهدف تجاري بأي شكل من الأشكال  
إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حال الاقتباس القصير يجب ذكر المصدر.



حضره صاحب الجلالة

السلطان هيثم بن طارق المعظم

-حفظه الله ورعاه-

المغفور له

السلطان قابوس بن سعيد

-طيب الله ثراه-



سُلْطَنَةُ عُمَانُ

(المحافظات والولايات)







## النَّشِيدُ الْوَطَنِيُّ



جَلَالَةُ السُّلْطَانِ  
بِالْعِزَّةِ وَالْأَمَانِ  
عَاهِلًا مُمْجَدًا

يَا رَبَّنَا احْفَظْ لَنَا  
وَالشَّغَبَ فِي الْأُوطَانِ  
وَلِيَلْدُمْ مُؤَيَّدًا

بِالنُّفُوسِ يُفْتَدِي

أَوْفِيَاءُ مِنْ كِرَامِ الْعَرَبِ  
وَأَمْلَئِي الْكَوْنَ ضِيَاءً

يَا عُمَانُ نَحْنُ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ  
فَارْتَقِي هَامَ السَّمَاءَ

وَاسْعَدِي وَانْعَمِي بِالرَّخَاءَ



# 〈 تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على خير المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

لقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية في جوانبها ومجالاتها المختلفة كافية؛ لتلبّي مُتطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته المستقبلية، ولتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة؛ بما يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجالات التنمية الشاملة للسلطنة.

وقد حظيت المناهج الدراسية، باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات المنظومة التعليمية، بمراجعة مستمرة وتطوير شامل في نواحيها المختلفة؛ بدءاً من المقررات الدراسية، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتوافق مع فلسنته وأهدافه.

وقد أولت الوزارة مجال تدريس العلوم والرياضيات اهتماماً كبيراً يتلاءم مع مستجدات التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي. ومن هذا المنطلق اتجهت إلى الاستفادة من الخبرات الدولية؛ اتساقاً مع التطور المتتسارع في هذا المجال، من خلال تبني مشروع السلالس العالمية في تدريس هاتين المادتين وفق المعايير الدولية؛ من أجل تنمية مهارات البحث والتقصي والاستنتاج لدى الطلبة، وتعزيز فهمهم للظواهر العلمية المختلفة، وتطوير قدراتهم التنافسية في المسابقات العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.

إن هذا الكتاب، بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، جاء محققاً لأهداف التعليم في السلطنة، وموائماً للبيئة العمánية، والخصوصية الثقافية للبلد، بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسوم. وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب، بالإضافة إلى غيره من المصادر المختلفة.

نتمنى لأبنائنا الطلبة النجاح، ولزملائنا المعلّمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة، لتحقيق أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمـة لـمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية

وزيرة التربية والتعليم

# المحتويات

xii .....	المقدمة .....
xiii .....	كيف تستخدم هذه السلسلة .....
xv .....	كيف تستخدم هذا الكتاب .....

## الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

٨٨ .....	١-٣ التفاعلات.....
٩٠ .....	٢-٣ علاقات التغذية .....
١٠١ .....	٣-٣ دورات المغذيات .....

## الوحدة الرابعة: التصنيف

١٢١ .....	٤-١ تصنيف الكائنات الحية البحرية .....
١٢٥ .....	٤-٢ المجموعات الرئيسية للكائنات الحية البحرية .....

## قائمة المصطلحات

# المقدمة <

تُعدّ العلوم البيئية دراسة للعالم الطبيعي، ولكيفية تفاعل الإنسان مع هذا العالم، يقوم بها من يهتم بدراسة الكائنات الحية في بيئته، مركّزاً على تأثير الإنسان على البيئة، وعلى إمكانية تغيير سلوكياته لمساعدة في حمايتها والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة. من الصعب تقديم تعريف واحد فقط للعلوم البيئية. وذلك لأنّه يعمل على مستويات عديدة ويؤثّر على كل جانب من جوانب حياتنا، بدءاً من طريقة تأقلم الكائنات البحرية مع محیطها، وصولاً إلى تلوث الغلاف الجوي الذي يحيط بنا.

يدرس علماء البيئة كل جانب من جوانب عالمنا الطبيعي، وكيفية تفاعله بهدف فهم عمل النظم البيئية، من أصغر بركة مياه إلى كوكب الأرض ككل. ثمة العديد من المجالات المختلفة للإدارة البيئية يرتكز كل مجال منها على معرفة أساسية، ولقد صمم كتاب الطالب ليتناسب مع بيئـة سلطنة عمان واحتياجاتها، مع التركيز بشكل خاص على العلوم البحرية، نظراً إلى أهمية هذا الموطن البيئي في الصناعة والاقتصاد داخل سلطنة عمان.

يمكن تطبيق المعرفة التي ستكسبها في هذا المنهج عبر نطاق واسع من المهن المستقبلية. يُستخدم كتاب الأنشطة والتجارب العملية ككتاب داعم لكتاب الطالب، وسيتيح أمام الطلبة فرصاً للبحث المعمق في الموضوعات المطروحة، فيساعدهم على تطوير مهاراتهم الرياضية والتحليلية والتدريب على حل أسئلة مشابهة لأسئلة الامتحانات. قد يقوم المعلم بتنفيذ بعض هذه الأنشطة داخل الصف، أو يعطيها كواجب منزلي؛ وإذا توافر الوقت يمكن للطلبة إجراء هذه الأنشطة بأنفسهم لتعزيز مهاراتهم الخاصة.

تُعدّ دراسة العلوم البيئية أمراً ملحاً، فمع تأثير تغير المناخ، وال الحاجة إلى مصادر طاقة أكثر تجددداً، وزيادة المعرفة بأهمية التنوع البيولوجي، واستمرار الاكتشافات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال، باتت حاجتنا اليوم إلى الوعي بالعلوم البيئية أكثر من أي وقت مضى. وسواء تابع الطلبة دراستهم وتخصصهم في المجال العلمي، أو قرروا الدخول في مجال آخر، يجب أن يكونوا جميعهم على درية تامة بكيفية العمل معًا لخلق مستدام وناجح لسلطنة عمان.

وللتعليم البيئي دور حيوي في تحقيق رؤية عمان 2040، من خلال توعية الأجيال القادمة بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

## استخدام العلوم البيئية

يمكن تطبيق العلوم البيئية بمجموعة متنوعة من الطرائق العملية من خلال مجموعة واسعة من المهن. فعلماء البيئة هم أشخاص متخصصون في الصناعة، ومحافظون على الطبيعة، ومهندسو، ومحامون، وصحفيون، ومتخصصون في الصحة البيئية، وموظفو حكوميون، وعاملون في المنظمات غير الحكومية. غالباً ما تتكون فرق العلوم البيئية من متخصصين في مجالات مختلفة، بحيث يعمل أعضاء الفريق معاً لإيجاد حلول للمخاوف البيئية المحتملة أو المحددة، ويشارك كل حسب مجال تخصصه وخبرته، ويتبادلون الأفكار والأراء والمقترنات.

باعتبارك عالماً بيئياً، ستعمل كجزء من فريق يعمل على تحقيق هدف مشترك.

## انضم إلى فريق العلوم البيئية

إن معرفتك بالبيئة ورغبتك في التأثير على كيفية تفاعل الإنسان مع العالم الطبيعي قد تؤدي إلى إحداث تغيير نحو الأفضل. عندما تدرس العلوم البيئية، فإنك:

- تعلم المزيد عن كوكب الأرض.
- تفكّر في كيفية تأثير أفعالنا لأنواع كائنات حية على الأرض.
- تفكّر بشكل ناقد، وتتّظر في استراتيجيات إدارة كيفية تأثيرنا، كنوع، على عالمنا.
- تطوير المهارات الأكاديمية الناقدة.

مهما كان مجال الدراسة الذي تسعى إليه، فإن المعرفة والمهارات البيئية التي تتعلمها في هذا الكتاب ستبقى معك. كلاماً سيساعدك على فهم التغيرات السريعة التي نشهدها في العالم اليوم.

**ملاحظة على الخرائط:** الحدود والأسماء الموضحة، والسميات المستخدمة وعرض المواد على أي خرائط واردة في هذا الكتاب لا تعني تأييداً رسمياً أو قبولاً من وزارة التربية في سلطنة عُمان للوضع القانوني لأي دولة أو إقليم أو منطقة أو لأي سلطة فيها أو لترسيم حدودها أو تخومها.

# 〈 كيف تستخدم هذه السلسلة

تقدّم هذه المكوّنات (أو المصادر) الدعم للطلبة في الصف الحادي عشر في سلطنة عمان لتعلم مادة العلوم البيئية واستيعابها، حيث تعمل كتب هذه السلسلة جميعها معًا لمساعدة الطلبة على تطوير المعرفة والمهارات العلمية الالزمة لمادة العلوم البيئية.


تم تصميم كتاب الطالب ليستخدمه الطلبة داخل الفصول الدراسية بتوجيه من المعلّمين. تحتوي الوحدات على تفسيرات وتعريفات وأسئلة ودراسة حالات وأمثلة عملية ومجموعة من الميزات الأخرى لإشراك الطلبة. كما تتيح لهم فرصةً كثيرة للمشاركة في نقاشات هادفة، والعمل الثنائي، والعمل الجماعي.



يحتوي «كتاب التجارب العملية والأنشطة» على أنشطة وأسئلة نهاية الوحدة، والتي تم اختيارها بعناية، بهدف مساعدة الطلبة على تطوير المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها أثناء تقديمهم في دراسة كتاب العلوم البيئية. كما تساعد هذه الأسئلة الطلبة على تطوير فهمهم لمعنى الأفعال الإجرائية المستخدمة في الأسئلة، إضافة إلى دعمهم في الإجابة عن الأسئلة بشكل مناسب.

كما يحقق هذا الكتاب للطلبة الدعم الكامل الذي يساعدهم على تطوير مهارات الاستقصاء العملية الأساسية. وكذلك مهارات تخطيط الاستقصاءات، و اختيار الأداة أو الجهاز المناسب وكيفية التعامل معه، وطرح الفرضيات، وتدوين النتائج وعرضها، وتحليل البيانات وتقديرها.





يقدم دليل المعلم عدداً من الأفكار العامة والدروس والواجبات المنزلية الملهمة للمعلمين. ويزودهم بإجابات الأسئلة الموجودة في كتاب الطالب وأسئلة الأنشطة وإرشادات ودعم لتنفيذ الاستقصاءات العملية. تتوافر أيضاً في دليل المعلم إرشادات تخطيط الدرس والدعم التربوي، إذ يتم تشجيع المعلمين على استخدام مزيج من أنشطة كتاب الطالب ودليل المعلم وفقاً لاحتياجات طلبة كل فصل.

# كيف تستخدم هذا الكتاب

## مصطلحات علمية

يتم تمييز المصطلحات الأساسية في النص عند تقديمها لأول مرة؛ أما المصطلحات الأساسية الأخرى غير المرتبطة بأهداف التعلم فجرى تمييزها بعلامة (\*). وقد جرى شرح معاني هذه المصطلحات في الهامش، وسوف تجد أيضاً تعريفات لها في قائمة المصطلحات الواردة في نهاية هذا الكتاب. المصطلحات التي لها علامة (\*) هي غير مطلوبة للحفظ لكنها مفيدة للموضوع.

من خلال دراستك لهذا الكتاب، ستلاحظ الكثير من الميزات المختلفة التي ستساعدك في التعلم. هذه الميزات موضحة على النحو الآتي:

### أهداف التعلم

تُمثل هذه الأهداف مضمون كل وحدة دراسية، وتساعد على إرشاد الطلبة خلال دراسة «كتاب الطالب»، كما تشير إلى المفاهيم المهمة المطروحة في كل موضوع، ويتم التركيز عليها عند تقويم الطالب.

### قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة

أنشطة استهلالية في بداية كل وحدة، تكون إما ثنائية أو جماعية أو صافية، وتحمّل حول المعرفة القبلية للموضوعات التي ستحتاج إليها قبل البدء بدراسة الوحدة.

### العلوم البيئية ضمن سياقها

تقدّم هذه الميزة أمثلة وتطبيقات واقعية للمحتوى الموجود في كل وحدة دراسية، ما يعني أنها تشجع الطلبة على إجراء المزيد من البحث في الموضوعات المختلفة. تتضمن أسئلة للمناقشة تحفز الطلبة على التفكير في فوائد ومشاكل هذه التطبيقات.

### أفعال إجرائية

لقد تمّ إبراز الأفعال الإجرائية الواردة في المنهج الدراسي بلون غامق في مربعات مميزة تتضمن تعريفاً للفعل والمهارات التي يجب عليك تطبيقها عند الإجابة عن أنواع مختلفة من الأسئلة. ويقل ظهور المربعات التي تتضمن الأفعال الإجرائية كلما أصبحت أكثر دراية بها. سوف تجد أيضاً التعريفات نفسها في قائمة المصطلحات الواردة في نهاية هذا الكتاب.

### مهارات الاستقصاء

توفر لك هذه الميزة فرصة لتطوير مهاراتك في البحث العلمي. وقد يتضمن ذلك إجراء تجربة، أو معالجة البيانات، أو إكمال مهمة بحثية، أو توقع النتائج.

### أمثلة

توضح لك الأمثلة كيفية التعامل مع عملية أو سؤال معين خطوة خطوة، ثم توفر لك الفرصة لتجربتها بنفسك. ستجد هذه الميزة مفيدة للأسئلة التي تتطلب استخدام صيغة رياضية للتوصيل إلى الإجابة.

### أسئلة

يتخلّل النص أسئلة تمنحك فرصة للتحقق من أنك قد فهمت الموضوع الذي قرأت عنه.

### دراسة حالة

تتيح لك دراسة حالة ودراسة حالة موسعة والأسئلة المصاحبة لاستكشاف حالات واقعية في إدارة البيئة بشكل فعال. كما تتيح لك فرصة لإنتاج عملك الخاص كعمل فردي، أو ثنائي أو ضمن مجموعات، وهي غير مرتبطة بأهداف التعلم.



### دراسة حالة موسعة

**مهم**

يتم في مريّعات النص هذه إدراج حقائق وإرشادات مهمة للطلبة.

تتضمن كل وحدة دراسة حالة موسعة تتناول بالتفصيل مشكلة أو حالة معينة في إطار واقعي حقيقي. فدراسة الحالة الموسعة تفتح أمام الطلبة باباً للتفكير في مسألة ما بمزيد من التعمق، وتتضمن أنشطة أو أسئلة أو مشاريع يمكنهم تحقيقها.

وبديهي القول إن الطلبة عندما يدرسون حالة من الحالات، لا يفعلون ذلك تحضيراً لامتحان، وإنما المهارات التي يستخدمونها للإجابة عن الأسئلة ستتساعدون في تجاوز الامتحان بنجاح.

### ملخص

تحتوي مريّعات النص هذه على ملخص للنقاط الرئيسية في نهاية كل وحدة.

### أسئلة نهاية الوحدة

تقيس هذه الأسئلة مدى تحقق الأهداف التعليمية في الوحدة، وقد يتطلب بعضها استخدام معارف علمية من وحدات سابقة. توافر إجابات هذه الأسئلة في دليل المعلم.

### قائمة تقييم ذاتي

تلي الملخص عبارات تتضمن عناوين منها: «أستطيع أن» التي تتطابق مع أهداف التعلم الموجودة في بداية الوحدة؛ و«أحتاج إلىبذل المزيد من الجهد»، أو «أقترب من تحقيق الهدف» اللتين تشيران إلى وجوب مراجعة ما تراه ضرورياً في هذا المجال. وقد تجد أنه من المفيد تقييم مدى ثقتك بكل من هذه العبارات أثناء عملية المراجعة.

أراجع الموضوع	واثق من الاستمرار	أقترب من تحقيق الهدف	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	أستطيع أن



الوحدة الثالثة

# التفاعلية في النظم البيئية البحريّة

Interactions in  
Marine Ecosystems



## أهداف التعلم

- الكربون الذي يستخدم في تكوين كافة المركبات العضوية
  - المغنيسيوم الذي يستخدم في تكوين الكلورو菲ل
  - الكالسيوم الذي يستخدم في تكوين العظام والأصداف والهيكل المرجانية
  - الفوسفور الذي يستخدم في تكوين DNA والعظام.
- ١١-٢ يذكر أن المغذيات يمكن أن تشمل غازات مثل  $\text{CO}_2$ ، وأيونات مثل  $\text{Mg}^{2+}$ ،  $\text{PO}_4^{3-}$ ،  $\text{CO}_3^{2-}$ ، و  $\text{NO}_3^-$ ، ومركبات عضوية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
- ١٢-٢ يذكر أن بعض المغذيات قابلة للذوبان وأن هناك مخزوناً لهذه المغذيات الذائبة في المحيط وهو متاح للمنتجات والمستهلكات.
- ١٣-٢ يشرح سبب محدودية الإنتاجية بفعل توافر المغذيات الذائبة.
- ١٤-٢ يشرح العمليات التي يتم من خلالها تجديد مخزون المغذيات الذائبة، بما في ذلك ذوبان غازات الغلاف الجوي، والإخراج والتحلل، وارتفاع التيارات الصاعدة للمياه، والجريان السطحي، والنشاط التكتوني.
- ١٥-٢ يذكر أن مخزون المغذيات الذائبة ينضب بسبب امتصاصها بواسطة الكائنات الحية.
- ١٦-٢ يلخص كيف ينقل الثلج البحري المواد العضوية التي تحتوي على الطاقة من المياه السطحية إلى عمق المحيط.
- ١٧-٢ يشرح أن المغذيات التي تمتصها الكائنات الحية في السلالس الغذائية يمكن إزالتها عن طريق الحصاد.
- ١-٣ يعرّف المصطلحات الآتية: التطفل، والتعايش والتبادل، ويدرك أنها كلها أمثلة على العلاقات التكافلية.
- ٢-٣ يصف العلاقة التطفلية بين مجذافيات الأرجل والأسمك البحري.
- ٣-٣ يصف العلاقة التعايشية بين أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا.
- ٤-٣ يصف العلاقة التبادلية بين سرطان البحر الملائم وشقائق النعمان.
- ٥-٣ يشرح أن المنتجات يمكن أن تكون كائنات حية تقوم بالتمثيل الضوئي أو التمثيل الكيميائي.
- ٦-٣ يعرّف الإنتاجية بأنها معدل إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة مساحة أو حجم لكل وحدة زمنية، ويشرح كيف يمكن أن تؤثر الإنتاجية الأولية العالية على السلسل الغذائية.
- ٧-٣ يحسب ويفسر فقدان الطاقة على طول السلسلة الغذائية.
- ٨-٣ يرسم ويصف ويفسّر أهرامات الأعداد والكتلة الحيوية والطاقة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الطفيليّات وفترات ازدهار العوالق النباتية مثل ازدهار الطحالب.
- ٩-٣ يعرّف المغذي على أنه مادة يحتاج إليها الكائن الحي للنمو أو الإصلاح أو الطاقة أو الأيض الطبيعي.
- ١٠-٣ يشرح أن بعض المغذيات تزوّد الكائنات الحية بمصدر للعناصر الأساسية وأن هذه العناصر لها أدوار حيوية مهمة:
- النيتروجين الذي يستخدم في تكوين البروتينات و DNA

### قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة

- ناوش من خلال العمل في مجموعة ثنائية ما تعرفه عن السلسل الغذائية، وارسم إن أمكن سلسلة غذائية بسيطة مع مسمياتها.
- اكتب أمثلة على مغذيات سمعت عنها وأسباب حاجة الكائنات الحية إليها.

- فكّر من خلال العمل في مجموعات صغيرة في أكبر عدد ممكّن من الطرائق التي قد تتفاعل بها الكائنات الحية من أنواع مختلفة فيما بينها. نظم قائمتك في تفاعلات إيجابية وتفاعلات سلبية.

### العلوم البيئية ضمن سياقها

#### أهمية العوالق النباتية

الاصطناعية لمراقبة مستويات العوالق النباتية في المحيطات، ويقارن لون الماء بلون الكلوروفيل والأصباغ الأخرى. وقد وجدت ناسا انخفاضاً في أعداد العوالق النباتية بشكل عام على مدى العقد الماضي؛ قد يعود ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، الأمر الذي يقلل من اختلاط طبقات الماء السفلية الغنية بالمغذيات بالطبقات العليا المعرضة للضوء light-exposed. إن انخفاض المغذيات يسبب تراجعاً في نمو وتکاثر العوالق النباتية. وبالمقابل، تتكون مناطق بحرية ميّة عندما تدخل أسمدة زائدة إلى الماء. حيث تصل الإنتاجية إلى الذروة فيفقد النظام البيئي توازنه، ويزداد عدد العوالق النباتية بشكل كبير في البداية في ظاهرة تعرف باسم ازدھار الطحالب Algal bloom. وعندها تموت خلايا هذه العوالق وتحلل بواسطة البكتيريا، تختفي مستويات الأكسجين. وفي نهاية المطاف، تصبح مستوياته منخفضة إلى حد كبير، بحيث لا يبقى سوى القليل من الحياة.

#### مصطلحات علمية

**الكريوهيدرات Carbohydrate:** مركبات عضوية توجد في الأنسجة الحية التي تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين (مثل، النشا والسليلوز والسكريات). يمكن تفكيك الكريوهيدرات في عملية التنفس لإطلاق الطاقة.

**ازدھار الطحالب Algal bloom:** زيادة سريعة في أعداد الجماعة الأحيائية للطحالب.

يعتمد ثلاثة مليارات من البشر تقريباً على النظم البيئية البحرية في غذائهم، فهم يحصلون على غالبية البروتين في نظامهم الغذائي من الأسماك المستخرجة من البحار أو من مزارع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى. وربما لا يدركون أن مصدر الكثير من الطاقة في طعامهم يأتي من كائنات حية دقيقة تسمى العوالق النباتية Phytoplankton، وهو مصطلح أصله يوناني يعني «النباتات المنجرفة» drifting plants، وهي كائنات حية دقيقة مجهرية تطفو في الطبقات العليا للمياه التي يصلها ضوء الشمس. كما أنها تحتوي على الكلوروفيل، مثل نباتات اليابسة، الذي يمكنها من القيام بعملية التمثيل الضوئي. تقوم العوالق النباتية بأكثر من نصف عملية التمثيل الضوئي على سطح الأرض، وتنتج ما يصل إلى 160 مليار طن من الكريوهيدرات Carbohydrate كل سنة.

قدرة العوالق النباتية على امتصاص الطاقة الموجودة في ضوء الشمس وتنبيتها في الكريوهيدرات ضرورية للحياة في المحيطات. ويجب على الكثير من المستهلكات أن تحصل على طاقتها من تناول العوالق النباتية مباشرة أو من أكل الحيوانات الأخرى التي تغذّت على العوالق النباتية. ويستفيد الإنسان من العوالق النباتية حتى ولو لم يتغذّ على المأكولات البحرية، إذ إن مصدر أكثر من نصف الأكسجين الذي يتفسّه الإنسان يأتي من عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها العوالق النباتية.

Civilian space programme المدني يستخدم البرنامج المدنى لوكالة الفضاء الأمريكية - ناسا (NASA) صور الأقمار

(تابع)

## أسئلة للمناقشة

٢. فكر في السبب الذي يدفع مؤسسة مثل وكالة ناسا إلى مراقبة العوالق النباتية في المحيط. ناقش من خلال العمل في مجموعات مدى أهمية ذلك، وما إذا كنت تعتقد أنه يمثل استخدامًا جيدًا للموارد (أي استخدام الأقمار الاصطناعية لمراقبة العوالق النباتية) والمال.

١. غالباً ما تتشكل المناطق البحرية الميتة عندما تدخل الأسمدة الزراعية إلى الماء من خلال الجريان السطحي، الأمر الذي يقلل عدد الأسماك المتاحة للصيد والمستخدمة كمصدر للغذاء. في المقابل، سينخفض العائد من المحاصيل الزراعية في حالة عدم استخدام الأسمدة. ناقش من خلال العمل في مجموعة ثنائية حلولاً لهذه المشكلة وتأثيراتها على النظم البيئية على اليابسة وفي المحيطات.

## مصطلحات علمية

**التكافل Symbiosis:** علاقة بين كائنَين حيَّين أو أكثر من أنواع مختلفة تعيش متقاربة جسمياً.

**الطفل Parasitism:** علاقة بين كائنَين حيَّين حيث يستفيد المُتَطَفِّل على حساب العائل.

**التعايش Commensalism:** علاقة بين كائنَين حيَّين حيث يستفيد أحد الكائِنَين الحيَّين في حين لا يتضرر الآخر ولا يستفيد.

**التبادل Mutualism:** علاقة بين كائنَين حيَّين مختلفين حيث يستفيد كلا الكائِنَين الحيَّين.

## ١-٣ التفاعلات

تعرفت في الوحدة الأولى كيف تعيش الكائنات الحية معًا في مجتمع أحياي، وما يحدث بينها من تفاعلات بيئية، قد تؤثر عليها بطرق مختلفة لذلك يمكن أن يستفيد بعضها ولا يستفيد الآخر. وتشمل التفاعلات البيئية العلاقات التكافلية وعلاقات التغذية بين الكائنات الحية، بالإضافة إلى دورات التغذية التي تتأثر بها وتؤثر فيها.

**التكافل Symbiosis** علاقة بين كائنَين حيَّين أو أكثر من أنواع مختلفة، تعيش قريبة بعضها من بعض جسمياً. وهي مصطلح أصله يوناني يعني «العيش معًا». يسمى الكائن الحي الأصغر المتكافل Symbiont، ويسمى الكائن الحي الأكبر العائل Host. ويوجد عدة أنواع من التكافل، بما في ذلك:

- الطفل Parasitism** - حيث يستفيد المتكافل ويضر العائل (على سبيل المثال، مجدافيات الأرجل والأسمك البحرية).

- التعايش Commensalism** - حيث يستفيد المتكافل ولا يتضرر العائل (على سبيل المثال، أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا).

- التبادل Mutualism** - حيث يستفيد كلا الكائِنَين الحيَّين من العلاقة (على سبيل المثال، سلطان البحر الملاكم وشقائق النعمان).

## أنواع العلاقات التكافلية

العلاقة التطفلية بين مجدافيات الأرجل  
والأسمك البحرية

مجدافيات الأرجل Copepods قشريات صغيرة تشبه الروبيان، توجد في كل من المياه العذبة والمياه المالحة. وهي واحدة من أكثر أشكال الحياة وفرة على الأرض، ويوجد آلاف الأنواع منها. نصف أنواعها تقريباً طفيلية، الأمر الذي يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة للتربية المائية للأسمك البحرية. من الأمثلة على مجدافيات الأرجل قمل البحر Sea lice الذي يوجد منه أكثر من 500 نوع. والنوعان الأكثر شيوعاً هما: القمل الطويل *Caligus elongates*، وقمل السلمون *Lepeophtheirus salmonis*.

شيطان البحر Manta ray (الصورة ٢-٣). تستطيع سمكة الريمورا التشبث بقوة تبلغ ثلاثة أضعاف وزنها، وقد أُجريت الدراسات عليها بهدف الاستفادة منها في تطوير تقنية لاصقة جديدة.

تُعد هذه العلاقة مثالاً على **الرَّحَلان Phoresis**، وهي علاقة تعايش لا يتأثر فيها العائل في حين يستخدم المتكافل العائل للانتقال. في هذه العلاقة، لا تتأثر سمكة شيطان البحر بحكم حجمها الكبير، في حين تستفيد سمكة الريمورا بعدم استهلاك طاقة للانتقال. وقد تصبح هذه العلاقة أيضاً تبادلية، إذ سجلت حالات أكلت فيها سمكة الريمورا الطفيليات التي تؤثر على سمكة شيطان البحر.

### مصطلحات علمية

\***طفيل خارجي Ectoparasite**: طفيلي مثل البرغوث أو القملة يعيش على سطح العائل.

\***طفيل داخلي Endoparasites**: طفيلي مثل الدودة الشريطية يعيش داخل جسم العائل.

**الرَّحَلان Phoresis**: علاقة تعايش يلت suction فيها أحد الكائنين الحيَّين بالكائن الحي الآخر للانتقال.



الصورة ٢-٣ سمكة شيطان البحر متلتصق بها اثنان من سمك الريمورا.

قمل البحر من **الطفيليات الخارجية Ectoparasites**، أي أنها تعيش على سطح جسم العائل كما توضحه الصورة ١-٣، (بينما **الطفيليات الداخلية Endoparasites** مثل الدودة الشريطية توجد داخل جسم العائل). يتغذى قمل البحر على المخاط والأنسجة والدم، وهذا يؤدي إلى موت سمكة العائل مباشرة، خصوصاً عند التصاق أعداد كبيرة منه بالخياشيم أو بالأسماك الصغيرة الأكثر عرضة للخطر. حتى الإصابة الأقل شدة تقلل من معدل نمو السمكة وتتركها عرضة للعدوى لأنواع المستزرعة فقط، بل قد ينتشر إلى الجماعات الأحيائية البحرية الأخرى، ويصبح ناقلاً لأمراض أخرى في ضوء انتشاره بين الأنواع، بما في ذلك فقر دم السلمون المعدي، والذي يتسبب به فيروس يؤدي إلى خسائر فادحة لمزارع الأسماك. في هذه العلاقة، تتأثر سمكة (العائل) سلباً، ويحصل قمل البحر (الطفيلي) على الطعام ويتأثر إيجاباً.



الصورة ١-٣ قمل البحر يتلتصق بسمكة سلمون صغيرة.

### علاقة التعايش بين أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا

سمكة الريمورا Remora (وتسمى أيضاً الأسماك الماصة Suckerfish) زعنفة ظهرية، يمكنها القيام بالشفط لتلتصق السمكة بالأسطح الملساء، ومنها جلد سمكة

## العلاقة التبادلية بين سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان

سرطان البحر الملاكم Boxer crabs (ويسمى أحياناً سرطان البحر بوم-Bom) ، سرطان بحر صغير (يقل عرضه عن 2 cm)، وينتمي إلى جنس *Lybia*. وقد جاء اسمه من شقائق النعمان التي يمسكها سرطان البحر بمخالبه لتبدو شبيهة بقفازات الملاكم أو كرات البوم-Bom (الصورة ٣-٣).



الصورة ٣-٣ سرطان البحر الملاكم يمسك بشقائق النعمان.

إن هذه العلاقة تبادلية، حيث يستفيد فيها كل كائن من الآخر. تحتوي شقائق النعمان على خلايا لاسعة Cnidocytes في لوامسها، يستخدمها سرطان البحر الملاكم للدفاع عن طريق إمساك شقائق النعمان بمخالبه. في المقابل تستطيع شقائق النعمان الحصول بسهولة على الطعام، كما تستخدم لوامسها كمكابس لتلتقط بواسطتها البقايا والطعام من مخبأ سرطان البحر. وقد وجد مؤخراً أن معظم سرطانات البحر تحمل اثنين من شقائق النعمان وهما نسختان متطابقتان ، وهذا يشير إلى أن سرطان البحر بمجرد أن يمتلك واحداً من شقائق النعمان يقسمه إلى قسمين: واحد لكل مخلب. كما لوحظ أن سرطان البحر الملاكم يغذى شقائق النعمان مباشرة، الأمر الذي يدل على أن سرطانات البحر تغذى وتزرع شقائقها بشكل نشط، كما لو أنها تعتي بحيوان أليف.

### أسئلة

- ١ انقل ثم أكمل الجدول ١-٢ باستخدام الرموز أدناه لإظهار تأثير العلاقات بين الأنواع المختلفة على كل من العائل والمتكافل:
- (٥) الأنواع لا تتأثر.
  - (-) الأنواع تتضرر.
  - (+) الأنواع تستفيد.

المتكافل	العائل	العلاقة
		التبادلية
		الطفلية
		التعايشية

الجدول ١-٣ العلاقات بين الأنواع المختلفة.

- ٢ قارن بين التطفل والتعايش.

- ٣ أعط مثلاً على علاقة تكافل. ثم سُمّ كائنين حيَّين يتشاركان هذا النوع من العلاقة، واكتب الضرار أو الفائدة لكل كائن حي.

## ٢-٣ علاقات التغذية

تعتمد كل أشكال الحياة على الأرض على الطاقة التي يتم تثبيتها في الكربوهيدرات عن طريق المنتجات والتي تسمى الكائنات الحية ذاتية التغذية Autotrophic . يستطيع الكائن الحي ذاتي التغذية صنع غذائه بنفسه بتكوين مركبات عضوية من جزيئات غير عضوية بسيطة. وتحتوي النظم البيئية البحرية على كائنات حية تقوم بالتمثيل الضوئي وعلى كائنات حية تقوم بالتمثيل الكيميائي Chemosynthetic ، فتختص الكائنات الحية

### مصطلحات علمية

**ذاتي التغذية Autotrophic :** كائن حي يمكنه امتصاص طاقة الضوء أو المواد الكيميائية واستخدامها لإنتاج الكربوهيدرات من جزيئات بسيطة مثل ثاني أكسيد الكربون.

**التمثيل الكيميائي Chemosynthesis :** إنتاج المركبات الكيميائية بواسطة البكتيريا أو كائنات حية أخرى باستخدام الطاقة الناتجة من التفاعلات مع مواد كيميائية غير عضوية.

## الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

أمثلة في النظم البيئية البحرية	
أسماك البيري التي تتغذى على الطحالب في الشعاب المرجانية	أكل الأعشاب
نوع سرطان البحر الذي يأكل الطحالب وصغار الأسماك واللافقاريات الصغيرة	القارب
الفقمات التي تصطاد وتأكل الحبار والروبيان والأسماك	أكل اللحوم

الجدول ٢-٣ أمثلة على الكائنات الحية البحرية ونوع تغذيتها.

### مصطلحات علمية

**غير ذاتي التغذية Heterotrophic:** كائن حي لا يستطيع صنع غذائه بنفسه، بل يتغذى على كائنات حية أخرى. جميع الحيوانات والفطريات والأواليات الحيوانية غير ذاتية التغذية، وكذلك معظم البكتيريا.

في النظم البيئية البحرية، تُعد العوالق الحيوانية Zooplankton مستهلكات مهمة وهي تشمل مجدافيات الأرجل والمثقبات Foraminifera والكرييل Krill. فمجدافيات الأرجل غير الطفيلية هي آكلة أعشاب صفيرة تتغذى على الدياتومات Diatoms؛ والمثقبات هي حيوانات وحيدة الخلية بأصداف من كربونات الكالسيوم، وهي في كثير من الأحيان من القوارض التي تتغذى على الطحالب ومجدافيات الأرجل؛ أما الكرييل فهو قارت يشبه الروبيان ويغذى على عوالق حيوانية أخرى وعوالق نباتية، وهو مصدر غذاء مهم للطيور والأسماك والفقمات والحيتان البالينية Baleen whales.

وعند موت الكائنات الحية تقوم المحللات Decomposers (البكتيريا والفطريات) بتفكيك جميع المغذيات العضوية في أجسامها. لذلك، تمثل المحللات المرحلة الأخيرة في أي علاقة غذائية، حيث تعود المغذيات إلى البيئة لتمتصها المنتجات.

التي تقوم بالتمثيل الضوئي الطاقة الموجودة في ضوء الشمس، في حين تستطيع الكائنات الحية التي تقوم بالتمثيل الكيميائي استخدام الطاقة من المواد الكيميائية الذائبة في الماء.

تحدث عملية التمثيل الضوئي في طبقة المحيط العليا المضاءة بالشمس. لذا فإن ٩٠٪ تقريباً من جميع الحياة البحرية توجد في هذه المنطقة. وتمثل قدرة الكائنات الحية التي تقوم بالتمثيل الكيميائي على بناء الكربوهيدرات تأقلمًا مهماً للعيش في الظروف القاسية، إذ توجد بالقرب من الفوهات المائية الحرارية Hydrothermal vents، وهي شقوق أو فجوات في قاع المحيط. ولا تحدث عملية التمثيل الضوئي هناك، لعدم وجود ضوء، وقد كان يعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تصل بها الطاقة إلى هذه الأماكن من المحيط تمثل بموت الكائنات الحية وسقوطها بقاياتها إلى القاع. ولم يتم إثبات خطأ هذا الاعتقاد حتى تم اكتشاف وجود المجتمعات الأحياء حول الفوهات المائية الحرارية في سبعينيات القرن الماضي.

**الكائنات الحية الأخرى غير ذاتية التغذية Heterotrophic** والتي تسمى المستهلكات يجب أن تحصل على طاقتها عن طريق التغذى على الكائنات الحية ذاتية التغذية. يمكن تقسيم الكائنات الحية المستهلكة إلى فئات متعددة اعتماداً على مدى قريبتها من المنتجات في السلسلة الغذائية. تتغذى المستهلكات الأولية مباشرة على المنتجات؛ في حين تتغذى المستهلكات الثانوية على المستهلكات الأولية. وتتغذى المستهلكات الثالثية على المستهلكات الثانوية، أما المستهلكات الرابعة فتتغذى على المستهلكات الثالثية. ومن النادر جداً العثور على المزيد من المستهلكات، بسبب الانخفاض في مقدار الطاقة المتاحة في كل مستوى غذائي.

يجب أن تكون على دراية بالمصطلحات: أكل الأعشاب، والقارب، وأكل اللحوم التي يوضح الجدول ٢-٣ أمثلة على كل منها في النظام البيئي البحري.

## الافتراض

تعلمت في الوحدة الأولى تمثيل العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية على شكل سلسل غذائية وشبكات غذائية، حيث تمثل الأسماء اتجاه انتقال الطاقة والكتلة الحيوية والمغذيات، كما في المثال الآتي:

السوطيات الدوارة ← جمبري ← سمك التونة ← سمك المرلين ← سمك القرش

تبدأ السلسلة الغذائية بـ كائن حي ذاتي التغذية (المنتج)، الذي يستخدم الطاقة من الضوء أو من المواد الكيميائية، لصنع جزيئات عضوية يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى زيادة كتلته الحيوية.

تعتمد **الإنتاجية الأولى** Primary productivity للنظام البيئي بشكل مباشر على مدى كفاءة المنتجات (مثل النباتات والطحالب) في تحويل الطاقة الشمسية إلى مركبات عضوية. وكلما زادت سرعة هذه العملية، زاد معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة بواسطة الكائنات الحية ذاتية التغذية في وحدة مساحة أو حجم لكل وحدة زمنية» في ما يُعرف بإنتاجية الأولى. على الرغم من أن مصارف الأنهر والمستنقعات والسبخات تتميز بأعلى إنتاجية لكل وحدة مساحة، إلا أن المحيطات، بفضل مساحتها الشاسعة، تسهم بأعلى **إنتاجية productivity** إجمالية على مستوى سطح الأرض (الصورة ٥-٣).

### مصطلحات علمية

**المفترس Predator**: حيوان يصطاد ويقتل ويأكل حيوانات أخرى.

**الفريسة Prey**: حيوان تأكله الحيوانات المفترسة.

**الإنتاجية الأولى Primary productivity**: معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة في نظام بيئي ما لكل وحدة مساحة أو حجم خلال فترة زمنية معينة، والتي تتبعها الكائنات الحية ذاتية التغذية.

**الإنتاجية Productivity**: معدل إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة مساحة أو حجم لكل وحدة زمنية.

يعد الافتراض من أهم العلاقات الغذائية التي تحصل بين **المفترس Predator** وال**الفريسة Prey**. فالمفترس حيوان يصطاد ويقتل ويأكل حيوانات أخرى. وقد تكون هذه الحيوانات مستهلكة ثانوية، أو ثالثية، أو رابعة. تشمل الحيوانات المفترسة البحرية القرش والأسماك. آكلة اللحوم التي تأكل العوالق الحيوانية والأسماك. وغالباً ما تتأقلم بشكل جيد من خلال سرعتها ورشاقتها، وقد تعتمد على التمويه، أو يكون لديها أسنان كبيرة، أو سم، أو تتصف بالقدرة على الصيد في مجموعات.

الفريسة هي الحيوانات التي تأكلها الحيوانات المفترسة. وغالباً ما تتصف الفريسة بالقدرة على التمويه، وبوجود أشواك دفاعية، والقدرة على الاختباء في أماكن آمنة، أو القدرة على الهروب.

تعد العلاقات بين المفترس والفريسة أمراً بالغ الأهمية للمحافظة على التوازن الصحي للجماعة الأحيائية في النظام البيئي. على سبيل المثال، بدون نجم البحر (الصورة ٤-٣) لن تكون هناك حيوانات مفترسة طبيعية لضبط أعداد بلح البحر وقنافذ البحر والمحار؛ إذ ستتمكن هذه الجماعات الأحيائية إذا أصبح عددها كبيراً جداً من أن تدمر غابة طحلب الكلب. وبالتالي سيؤثر هذا سلباً على الأنواع الأخرى التي تتغذى على طحلب الكلب أو تعيش في داخله.



الصورة ٤-٣ نجم البحر يأكل بلح البحر.



الصورة ٣-٥ من أهم الكائنات الحية البحرية ذاتية التغذية الضوئية: (أ) عوالق نباتية (ب) طحلب الكلب (ج) حشائش البحر.

قد تتحدد الإنتاجية الأولية بفعل درجة حرارة الماء وتتوفر المغذيات وشدة الضوء، وقد تتأثر جميعها بأنماط الطقس والمناخ. يسخن ضوء الشمس سطح المحيط فيزيد من الطاقة الحركية لجزيئات الماء مكوناً طبقة ماء أقل كثافة. وتمثل المنطقة الانتقالية بين الماء الدافئ الأقل كثافة والماء البارد الأكثر كثافة تدرج الكثافة Pyconcline، وتسمى أيضاً المنحدر الحراري Thermocline الذي يقلل من اختلاط هاتين الطبقتين أو يؤدي إلى اختلاط بسيط بينهما. وعلى الرغم من أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً قد تزيد من إنتاجية الكائنات الحية ذاتية التغذية الضوئية، إلا أن معظم المياه الغنية بالمغذيات توجد تحت المنحدر الحراري. وعادة ما يكون موقع الإنتاجية الأعلى بالقرب من المنحدر الحراري حيث يوجد التوازن الأمثل بين شدة الضوء ودرجة الحرارة وتتوفر المغذيات.

### التمثيل الضوئي


الكائنات الحية ذاتية التغذية الضوئية Photoautotrophs (الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي) في المحيط، تشمل العوالق النباتية والكائنات الحية البسيطة أحادية الخلية، والطحالب الكبيرة Macroalgae مثل طحلب الكلب Kelp وحشائش البحر Seagrasses (الصورة ٣-٥). سترى المزيد عن هذه الكائنات الحية في الوحدة الرابعة. لا تحدث عملية التمثيل الضوئي إلا في نطاق المنطقة الضوئية Photic zone من المحيط، حيث لا يمكن للضوء أن يخترق الماء أكثر ليصل إلى المياه العميقة (الشكل ١-٣). لذلك توجد غالبية الكتلة الحيوية في المحيط ضمن الطبقة العليا المضاءة والتي تصل إلى نحو 200 متر من سطح الماء.

#### مصطلحات علمية

- ذاتي التغذية الضوئية Photoautotrophs:** كائن حي يستخدم طاقة الضوء لصنع مركبات عضوية.
- المنطقة الضوئية Photic zone:** الطبقة السطحية من المحيط التي تتلقى ضوء الشمس.

### التمثيل الكيميائي

لا يستطيع الضوء اختراق الماء إلى قاع المحيط لتحدث عملية التمثيل الضوئي فيه. ومع ذلك، تحتوي هذه المياه الغنية بالمغذيات على مصادر للطاقة الكيميائية توجد في جزيئات مثل كبريتيد الهيدروجين. الكائنات الحية



الشكل ١-٣ طبقات الماء في المحيط.

مع المياه السطحية، الأمر الذي يحد من الإنتاجية؛ أما في المناطق القطبية، فإن بروادة المياه تؤدي إلى خلط أكبر للمياه، مما يوفر مغذيات كثيرة تدعم نمو العوالق النباتية والحيوانية، وبالتالي سلاسل غذائية أطول قد تصل إلى خمسة أو ستة مستويات غذائية خلال فصل الصيف عندما يكون الضوء كافياً.

على عكس البيئات البرية مثل السافانا والغابات، لا تتراءم الكتلة الحيوية في المحيطات بشكل واسع النطاق. ومع ذلك، تؤدي العوالق النباتية دوراً حيوياً في النظام البيئي البحري، حيث تتكاثر بسرعة وتتوفر غذاءً مستمراً للمستهلكات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العوالق النباتية في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وبعد قيامها بعملية التمثيل الضوئي وتبثث ثاني أكسيد الكربون في الكتلة الحيوية، تفرق عندها إلى قاع المحيط، مما يؤدي إلى احتجاز الكربون في الأعماق. سيناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الموضع ٣-٢.

إذا زاد مستوى المغذيات كثيراً أو بوتيرة سريعة فقد تتكاثر العوالق النباتية والطحالب بسرعة كبيرة جداً، ما يؤدي إلى ظاهرة تسمى ازدحام الطحالب Algal bloom، المماثلة لظاهرة الإثراء الغذائي Eutrophication في النظم البيئية للمياه العذبة، حيث يمكن إنتاج ما يصل إلى خمسة ملايين خلية طحلب لكل لتر ماء، في فترة زمنية قصيرة جداً. وهذه الكثافة المرتفعة من هذه الكائنات

### مصطلحات علمية

**\* ذاتي التغذية الكيميائية Chemoautotroph:** كائن حي يمكنه استخدام الطاقة الكيميائية لبناء المواد العضوية.

**\* حبّة للظروف القاسية Extremophile:** كائن حي متآقلم للبقاء في ظروف قاسية من درجات الحرارة أو الضغط أو الملوحة أو الرقم الهيدروجيني.

**\* الإثراء الغذائي Eutrophication:** عملية إثراء المسطح المائي بالمغذيات الذائبة (مثل النترات والفوسفات) التي تحفز نمو المنتجات، مما يؤدي عادة إلى استفادة الأكسجين المذاب.

**ذاتي التغذية الكيميائية Chemoautotroph** هي نوع من البكتيريا يستخدم هذه الطاقة الكيميائية لتحويل الغازات الكربونية الذائبة إلى جزيئات عضوية يمكن الاستفادة منها. اكتشفت البكتيريا ذاتية التغذية الكيميائية لأول مرة في الفوهات المائية الحرارية في قاع المحيط سنة 1977 م. وقد وجدت الفوهات على أعماق متفاوتة تتراوح بين 2000 m تقريباً في مرتفعات غالاباغوس و 7700 m في مرتفع وسط المحيط الأطلسي؛ وهي عميقـة جداً بحيث لا يمكن أن يصل الضوء إليها. توفر الكائنات الحية ذاتية التغذية الكيميائية بداية السلسلة الغذائية في النظم البيئية للفوهات المائية الحرارية، وأنواع القادرة على العيش فيها هي الكائنات **المحبة للظروف القاسية Extremophiles**، إذ إنها تبقى على قيد الحياة في ظروف قاسية من الضغوط العالية ودرجات حرارة تتراوح بين 2 °C و 400 °C.

### تأثيرات التغيرات في الإنتاجية على السلسلة الغذائية

لا تكون كل الكتلة الحيوية التي تتوجهها الكائنات الحية ذاتية التغذية متوافحة للمستهلكات، إذ تستهلك المنتجات بعض الكتلة الحيوية في عملية التنفس لتوليد الطاقة. وتتنقل الكتلة الحيوية المتبقية إلى المستهلكات، وتسمى صافي الإنتاجية الأولية Net primary productivity؛ أما الإنتاجية الثانوية Secondary productivity فهي معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة بواسطة المستهلكات بعد التغذى على المنتجات.

كلما زاد صافي الإنتاجية الأولية، زادت قدرة النظام البيئي على دعم عدد أكبر من الجماعات الأحيائية للمستهلكات، وسلاسل غذائية أطول. فمناطق المحيطات التي تشهد ارتفاعاً في التيارات الصاعدة، والتي تحمل معها مغذيات من الأعماق، تكون غنية بالحياة البحرية. على عكس، المناطق الاستوائية، التي بالرغم من وفرة الضوء، تعاني ارتفاع درجة حرارة المياه الذي يوفر منحدراً حرارياً يقلل بشكل كبير من اختلاط المياه العميقـة الغنية بالمغذيات


## انتقال الطاقة عبر السلسلة الغذائية

تشتّت المنتجات على الأرض كمية صغيرة فقط من الإشعاع الصادر عن الشمس، ولا يصل بعض الإشعاع مطلقاً إلى المنتجات لأنّه ينعكس مرة أخرى إلى الفضاء. وبعض الضوء الذي يصل إلى المحيط إما أن يتم امتصاصه أو ينعكس أو يتشتّت عن طريق الماء، وما تبقى منه يكون متاحاً للمنتجات، التي لا تستخدمه بكماله. يكون بعض الضوء بأطوال موجية لا تتناسب صبغات المنتجات لامتصاصها؛ فعلى سبيل المثال، يمتص الكلوروفيل الضوء الأحمر والأزرق، وينعكس الضوء الأخضر (وهذا سبب ظهوره باللون الأخضر). وعلى الرغم من أن بعض الضوء ذو أطوال موجية مناسبة إلا أنه لا يصل إلى البلاستيدات، وبالتالي لا يتم امتصاصه (الشكل ٢-٣).

عملية التمثيل الضوئي نفسها ليست فعالة في استخدام الطاقة بشكل كامل، إذ يتم فقدان الطاقة على شكل حرارة خلال تفاعلات كيميائية تحدث عادة أثناء العملية. وتشير التقديرات إلى أن المنتجات في جميع أنحاء العالم تثبت ٠.٠٦% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية المتاحة في النظم البيئية المائية، وقد يصل هذا الرقم إلى ١%.

الحياة الدقيقة قد تسد خياشيم السمكة بحيث لا تتمكن من الحصول على كفايتها من الأكسجين. وب مجرد موت العوالق النباتية أو الخلايا الطحلبية ستتحلل بواسطة المحللات البكتيرية، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الجماعات الأحيائية البكتيرية.

تستخدم البكتيريا الأكسجين المذاب في الماء للقيام بعملية التنفس، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين المذاب. ويسبب هذا الأمر موت الجماعة الأحيائية غير ذاتية التغذية وبالتالي انخفاض أعدادها. وإذا كانت أنواع الطحالب منتجة أيضاً للسموم، فستتسمم الكائنات الحية التي تأكل هذه الطحالب، ما قد يتسبب بموت جماعي لهذه الكائنات الحية المائية كالدلافين وخراف البحر والحيتان، إضافة إلى التسمم الغذائي للأشخاص الذين يأكلون المحاريات الملوثة.



تعتمد الإنتاجية الثانوية على:

- الكتلة الحيوية الممتدة في المنتجات.
- كمية الطاقة التي تفقدتها المستهلكات خلال عملية التنفس.
- كمية الطاقة التي تفقد في الفضلات مثل البول (الشكل ٣-٣).

تفقد معظم أسماك المياه المالحة كميات صغيرة فقط من البول وتقرز معظم فضلاتها النيتروجينية على شكل أمونيا عبر الخياشيم. ويتم إخراج الطعام غير المهضوم على شكل براز.

يمكن التعبير عن عمليات انتقال الطاقة بالصيغة الآتية:


$$C = P + R + F + U$$

حيث (C) الطاقة المستهلكة، و (R) الطاقة المستخدمة في التنفس، و (F) الطاقة الموجودة في البراز، و (U) الطاقة الموجودة في البول وفضلات عمليات الأيض الأخرى، و (P) الطاقة المتبقية لإنتاج كتلة حيوية جديدة بواسطة الحيوان.

وبذلك تكون طاقة الإنتاج (P) ممتدة لانتقال إلى المستوى الغذائي التالي.

يستخدم بعض الجلوكوز الناتج من عملية التمثيل الضوئي في التنفس، وهذا يعني أن صافي الإنتاجية فقط من الكتلة الحيوية يكون متاحاً فقط للمستوى الغذائي التالي. وتُمرر الطاقة المخزنة في الكتلة الحيوية إلى الكائنات غير ذاتية التغذية عندما تتناول وتهضم وتمتص المغذيات من المنتجات، وعندما يمكن أن يتم التمثيل الغذائي لهذه المغذيات في كتلة حيوية جديدة. وبأكل المستهلك الأولي الخلية كلها عندما تكون المنتجات من العوالق النباتية، لذا تُنقل كل الطاقة الممتدة. وبالنسبة، توجد أجزاء لا تؤكل من الطحالب الكبيرة والنباتات الجذرية مثل الأعشاب البحرية (الجذور على سبيل المثال)، لذا لن تكون الطاقة المخزنة في هذه الأجزاء ممتدة إلى المستوى الغذائي التالي، على الرغم من أنها قد تعود إلى النظام البيئي عن طريق التحلل عندما يموت النبات.

تتمثل الإنتاجية الثانوية بإنتاج كتلة حيوية جديدة بواسطة المستهلكات. وهي تشمل الحيوانات التي تأكل العوالق النباتية والطحالب الكبيرة والأعشاب البحرية والحيوانات التي تأكل حيوانات أخرى. وتفتكك المحللات مثل البكتيريا والفطريات المادة العضوية الميتة لتحصل على المغذيات التي تحتاج إليها. وهذا يطلق أيضاً المغذيات في النظام البيئي.



الشكل ٣-٣ نقل الطاقة إلى المستهلك ومنه.

الغذائية. وتكون المنتجات دائمًا في القاع (أسفل الهرم)، أعلىها المستهلكات الأولية، والمستهلكات الثانوية، والمستهلكات الثالثية. ولا تظهر محللات غالباً في الهرم على الرغم من انتقال الطاقة إليها بمجرد موت المنتجات والمستهلكات.

### أهرامات الأعداد

**يبين هرم الأعداد Pyramid of numbers** ببساطة عدد الكائنات الحية الموجودة في كل مستوى غذائي في لحظة من الزمن. ويتناسب فيه حجم كل شريط أفقي مع عدد الكائنات الحية. من الناحية النظرية، يجب أن يكون هذا الأمر بسيطاً جدًا، لكنه في الواقع صعب نوعاً ما. فغالباً ما يصعب تقدير عدد الكائنات الحية الموجودة بدقة، حتى وإن تحقق ذلك، فمن الصعب توضيحه بمقاييس الرسم. فعلى سبيل المثال، تكون السلسلة الغذائية النموذجية في المحيط كما يأتي:

عوالق نباتية ← عوالق حيوانية ← سمك شمس المحيط  
← سمك القرش

قد توجد ملايين من خلايا العوالق النباتية وسمكة قرش واحدة فقط أو سميكتين، وبالتالي يستحيل العثور على مقاييس رسم يبيّن ذلك. لذا ترسم العديد من

#### مصطلحات علمية

**هرم الأعداد Pyramid of numbers**: رسم تخطيطي يبيّن عدد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية.

بشكل عام، تبلغ كفاءة الانتقال بين المستويات الغذائية 10% تقريباً، لكنها تختلف بحسب:

- مقدار الطعام الذي يؤكل.


- مدى سهولة هضم المستهلك للمغذيات والتمثيل الغذائي لها (أي تحويلها إلى طاقة).

- مقدار الطاقة المستخدمة للحركة.
- مقدار الفاقد في فضلات الأيض.

بعض الكائنات الحية أسهل في الهضم والتمثيل الغذائي من الكائنات الحية الأخرى: بشكل عام، تجد المستهلكات أنه من الأسهل لها الاستفادة من الطاقة الموجودة في حيوانات أخرى عوضاً من الاستفادة من الطاقة الموجودة في المنتجات؛ لأن ذلك سوف يوفر انتقال المزيد من الطاقة إلى المستهلك التالي. بالإضافة إلى ذلك، بعض الكائنات الحية في كل مستوى غذائي تقلت من الافتراض، لذا لا تتقلل الطاقة المخزنة في كتلتها الحيوية إلى المستوى التالي مطلقاً.

### توضيح علاقات التغذية

يمكن إظهار العلاقات بين المستويات الغذائية المختلفة باستخدام أهرامات الأعداد وأهرامات الكتلة الحيوية وأهرامات الطاقة. تتكون هذه الأهرامات من أشرطة أفقية مرتبة على شكل هرم يُظهر سلسلة غذائية معينة. ويمكن رسم السلسلة بحسب مقاييس الرسم أو على شكل رسم تخطيطي (تقريبي) لتقديم فكرة عن التغيرات أثناء انتقال الطاقة على طول السلسلة



الشكل ٣-٤ (أ) هرم أعداد عام، (ب) هرم الأعداد للنظام البيئي البحري يبيّن طفيليّات صغيرة تتغذى على سمكة كبيرة.

للكائنات الحية داخل النظام البيئي بعد إجراء القياسات، الأمر الذي يجعل الهرم غير دقيق.

يصعب تحديد الكتلة الحيوية لكل مستوى غذائي بدقة، إذ تختلف الكائنات الحية في كمية الماء التي تحتويها، وهذا الماء لا يُسهم في كتلتها الحيوية. لهذا السبب يجب استخدام الكتلة الجافة مع إزالة الماء بالتبخر. وللقيام بذلك، يجب قتل الكائنات الحية، وهو إجراء ليس ملائماً أو غير مرغوب فيه عند قياس الكتلة الحيوية للسلسلة الغذائية بأكملها. وبدلاً من ذلك ثمة تحويلات يمكن استخدامها لتحويل كتلة المادة الحية إلى كتلة جافة. وهذا يعني أنه يجب العثور على كل فرد وقياس كتلته؛ أو يمكن أخذ الكتلة الحية للعينة، ثم ضربها في العدد الإجمالي للكائنات الحية للحصول على متوسط الكتلة الجافة الكلية. تعطي كل من هاتين الطريقتين تقديرًا لكتلة الحيوية الإجمالية وإن كانت بشكل غير دقيق تماماً.

قد يكون **هرم الكتلة الحيوية** **Pyramid of biomass** مقلوباً في كل الأوقات حيث إن كمية الكتلة الحيوية الإجمالية في العوالق النباتية صغيرة لأنها تؤكل بسرعة كبيرة. لكن معدل تكاثرها سريع جداً، إذ تتکاثر بسرعة كبيرة لتوفير كتلة حيوية كافية للمحافظة على الجماعة الأحيائية للمستهلكات. بعبارة أخرى، يمكن القول إن كمية الكتلة الحيوية صغيرة، لكن معدل إنتاج الكتلة مرتفع.

#### مصطلحات علمية


**هرم الكتلة الحيوية** **Pyramid of biomass**: رسم تخطيطي يبيّن الكتلة الحيوية الموجودة في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية.

أهرامات الأعداد على شكل رسوم تقريبية بدلاً من رسماها على مقاييس محددة (الشكل ٣-٤).

بالإضافة إلى أنه يتم استهلاك الكثير من العوالق النباتية بسرعة كبيرة بعد إنتاجها. إذا كانت الأعداد تحسب في النظام البيئي بعد أن يؤكل معظم هذه العوالق فإن الهرم سيكون مقلوباً، وسيبدو وجود عدد أقل من العوالق النباتية مقارنة بالعوالق الحيوانية. أيضاً يختلف عدد الكائنات الحية في النظام البيئي اعتماداً على عوامل مثل الوقت من السنة وكمية الصيد. وهذا يعني أن الهرم قد يبيّن فقط الأعداد في كل مستوى غذائي في لحظة معينة من الزمن. لا تأخذ أهرامات الأعداد أيضاً في الاعتبار حجم الكائنات الحية، والتي قد تؤدي إلى أهرامات غريبة المظهر. على سبيل المثال، سوف ترى الهرم مقلوباً في حالة تغذية عدة طفيلييات صغيرة على سمكة كبيرة واحدة (الشكل ٣-٤ ب).

#### أهرامات الكتلة الحيوية

بدلاً من تحديد عدد كل كائن حي، يمكننا قياس إجمالي كتلتها الحيوية. تتغلب هذه الطريقة على صعوبة اختلاف أحجام الكائنات المختلفة، على سبيل المثال، الطفيليات الصغيرة التي تتغير على سمية كبيرة كما ذكر في المثال السابق. ولكن، لا تحل طريقة قياس الكتلة الحيوية الإجمالية مشكلة استهلاك العوالق النباتية قبل قياسها. كذلك، من المحتمل أن تزداد أو تقل الكتلة الحيوية



الشكل ٣-٥ (أ) يبيّن هرم الكتلة الحيوية الانخفاض في الكتلة الحيوية عبر السلسلة الغذائية  
 (ب) الهرم المقلوب للكتلة الحيوية يبيّن المشكلات الناجمة عن المحصول القائم للعوالق النباتية التي تتکاثر بسرعة.

## الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

بسبب ظروف نقص الأكسجين، ستختفي الكتلة الحيوية بكميات كبيرة. وعندما يحدث هذا الأمر، ستتوفر طاقة أقل لتمر عبر السلسلة الغذائية، وبالتالي ستختفي الطاقة في كل مستوى غذائي. ومع ذلك، غالباً ما تكون العوالق النباتية التي تنمو بشكل كبير أثداء الازدهار أنواعاً غير صالحة للأكل بفعل البكتيريا الخضراء المزرقة Cyanobacteria. عندما تختفي نسبة الخلايا الصالحة للأكل من العوالق النباتية، فهذا يعني عدم زيادة أعداد العوالق الحيوانية بالقدر المتوقع. ونتيجة لذلك سيكون شريط العوالق النباتية في جميع أنواع الأهرامات الثلاثة أكبر من الطبيعي. وسيكون شريط العوالق الحيوانية أصغر من المتوقع، ومع انتقال طاقة وكتلة حيوية أقل عبر السلسلة الغذائية سيكون هناك أيضاً عدد أقل من العوالق الحيوانية.

### مصطلحات علمية

**هرم الطاقة** Pyramid of energy: رسم تخطيطي يبيّن

مقدار الطاقة الموجودة في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية.

### أسئلة

- ٤ اذكر الطريقتين اللتين يتم بهما إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة في المحيط.
- ٥ اشرح: لماذا تقتصر إنتاجية المحيطات على عمق لا يزيد عن 200 m؟
- ٦ اشرح سبب احتياج الكائنات الحية إلى عملية التنفس.
- ٧ اشرح: لماذا يفضل استخدام الكتلة الجافة لتكون أهرامات الكتلة الحيوية؟
- ٨ صف الهرم المقلوب، وارجع سبب حدوثه.


### أفعال إجرائية

اذكر State: عبر بكلمات واضحة.

تسمى الكتلة الحيوية المقاسة في لحظة معينة من الزمن بالمحصول القائم Standing crop (الشكل ٣-٥).

### أهرامات الطاقة

يبين **هرم الطاقة** Pyramid of energy معدل إنتاج الكتلة الحيوية بدل المحصول القائم، لذا يكون دائماً على شكل هرم (الشكل ٣-٦)، ويتضمن تحديد الطاقة في كل مستوى غذائي في السلسلة الغذائية، وهو إجراء معقد، تجمع فيه البيانات على مدى فترة طويلة، عادة ما تكون سنة. كما تستخدم في كثير من الأحيان جداول التحويل التي تحول الكتل الجافة إلى طاقة. تستخدم في هرم الطاقة وحدات  $\text{kJ m}^{-2} \text{ year}^{-1}$  (kJ/m<sup>2</sup> year)، لذلك لن يكون محسولاً قائماً بل هو قياس للطاقة المتوفرة على مدار السنة بأكملها. وأهرامات الطاقة هي على الأرجح الأكثر فائدة من حيث فهم النظام البيئي على الرغم من أنها الأصعب في إنتاجها.



الشكل ٣-٦ هرم عام للطاقة يبيّن الانقال التقريبي بين المستويات الغذائية.

### أهرامات الأعداد والكتلة الحيوية والطاقة أثناء ازدهار الطحالب

من المتوقع زيادة الأعداد، والكتلة الحيوية، والطاقة للعوالق النباتية أثناء ازدهار الطحالب، تليها زيادة الأعداد، والكتلة الحيوية، والطاقة للعوالق الحيوانية والمستهلكات الأخرى، حيث يتواجد المزيد من الطاقة لتمر على طول السلسلة الغذائية. وبمجرد أن تبدأ الحيوانات بالموت

## مثال

١. ما مقدار الطاقة المفقودة في عملية التنفس بواسطة المستهلكات الثانوية الموضحة في الشكل ٧-٣

تذكّر أن الطاقة التي تدخل المستهلكات الثانوية يجب أن تساوي الطاقة الخارجة منها.

قد ترى من الرسم التخطيطي أن  $598 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$  من الطاقة تدخل المستهلكات الثانوية (سهم الدخول)، وأن  $67 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$  تنتقل إلى المحللات.

السهم الأخير الوحيد هو سهم التنفس (المسمى X).

لذا، يجب أن تساوي الطاقة المفقودة في عملية التنفس،  $598 - 67 = 531 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$ .

يمكن التتحقق من الإجابة بالتأكد من الأسماء:

«سهم الدخول» 598 و «سهما الخروج» 67 و  $598 - 67 = 531$ . لذا الإجابة صحيحة.

٢. ما النسبة المئوية للطاقة التي تنتقل من الشمس إلى المنتجات؟

من المفيد حساب النسبة المئوية لأنها تتيح المقارنة بين النظم البيئية المختلفة، حيث تختلف مدخلات الطاقة الأولية. النسبة المئوية هي الطاقة المنتقلة مقسومة على الطاقة التي كانت في المستوى الغذائي السابق، مضروبة في 100.

كانت الطاقة المنقوله إلى المنتجات  $72567 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$  وكانت الطاقة في المستوى الغذائي السابق (الشمس)  $1.6 \times 10^6 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$ .

لذا تكون النسبة المئوية المنقوله:

$$\frac{72567}{1.6 \times 10^6} \times 100 = 4.54\%$$

وقد تُعطى معلومات مماثلة على شكل هرم للطاقة؛ في هذه الحالة استخدم الأعداد الموجودة في الهرم لحساب النسبة المئوية. أقسم دائمًا الرقم لأي مستوى غذائي معين على الرقم الخاص بالمستوى الغذائي السابق ثم اضربه في .100.


على سبيل المثال:

$$\frac{\text{الطاقة في المستهلكات الأولية}}{\text{الطاقة في المنتجات}} \times 100$$

### تفسير الرسوم التخطيطية للطاقة ورسم أهرامات الطاقة

تمثل رسوم الطاقة التخطيطية طريقة أخرى لتوضيح تدفق الطاقة في النظام البيئي (الشكل ٧-٣). وهي تبيّن دخول الطاقة إلى النظام البيئي من الشمس وانتقالها عبر المنتجات وفقدانها نتيجة التنفس والإخراج. النقطة الرئيسية التي يجب تذكرها هي أن كل الطاقة يجب أن تذهب إلى مكان ما، وبالتالي يجب أن تكون القيم على الأسهم التي تدخل الصندوق متساوية دائمًا لمجموع القيم على الأسهم التي تخرج منه. يمكن استخدام الوحدات ( $\text{kJ/m}^2 \text{ year}$ ) أو وحدات تقديرية. فالوحدات التقديرية هي وحدات قياس نسبية تستخدم للمقارنة بين الكميات، ولا تتبع أي نظام قياس عالمي موحد. على سبيل المثال، إذا كانت الطاقة في المنتجات ضعف تلك التي في المستهلكات الأولية، فقد تكون الوحدات التقديرية: ٥ و ١٠ أو ٥٠ و ١٠٠، وكلاهما صحيح طالما نعيّن الضغف بطريقة مناسبة.

## مثال:




الشكل ٧-٣ مثال عملي على الرسم التخطيطي لتدفق الطاقة (الوحدات المستخدمة بـ  $\text{kJ/m}^2 \text{ year}$ ).

- أسئلة**
١. أ. احسب كمية الطاقة التي تستخدمها المستهلكات الأولية الواردة في الشكل ٧-٣ في التنفس (٪).
  - ب. احسب النسبة المئوية للطاقة المنقولة بين المنتجات والمستهلكات الأولية.
  ٢. أ. ارسم رسمًا تقريريًّا لهرم طاقة للبيانات الآتية: الأسماك ٨٦ وحدة تقديرية، العوالق الحيوانية ٩١٢ وحدة تقديرية، العوالق النباتية ٨٠٠٠ وحدة تقديرية.
  - ب. استخدم البيانات من الهرم لحساب النسبة المئوية للطاقة المنقولة من العوالق الحيوانية إلى الأسماك.
  - ج. يبلغ متوسط النسبة المئوية للطاقة المنقولة بين المنتجات والمستهلكات الأولية ١٠٪. اقترح: لماذا يكون الانتقال في هذه السلسلة الغذائية بين العوالق النباتية والعوالق الحيوانية أعلى من ذلك؟

٣. ارسم رسمًا تقريريًّا لهرم الطاقة يوضح الطاقة في المنتجات والمستهلكات الأولية والثانوية. لن تضطر إلى رسم مخطط لتدفق الطاقة، لكن قد يكون عليك رسم هرم الطاقة. إذا طلب إليك رسمه وفقًا للمقياس، فاعتبر أن كل شريط في الهرم يشبه الأعمدة الموجودة على التمثيل البياني بالأعمدة. غالباً ما تقدم البيانات في هذه الحالة بالوحدات التقديرية لتسهيل ملائمتها لمقياس واحد. إذا طلب إليك تنفيذ رسم تقريري لهرم الطاقة (أو الأعداد أو الكتلة الحيوية)، فلا ضرورة إلى رسمه وفقًا للمقياس، بل يجب أن تكون الأشرطة أكبر أو أصغر تبعًا للأعداد المتوفرة. يتم رسم المنتجات على أنها الشريط الأدنى، يليها المستهلكات الأولية ثم المستهلكات الثانية وصولاً إلى قمة السلسلة الغذائية. اكتب في كل شريط مسمى الكائن الحي من السلسلة الغذائية التي ترسمها.

### مصطلحات علمية

**دورات المغذيات Nutrient cycles:** حركة وتبادل العناصر الضرورية للحياة من الجزيئات غير العضوية ومن خلال التثبيت، ومن ثم إلى الكائنات الحية، قبل أن تتحلل مرة أخرى إلى جزيئات غير عضوية.



الشكل ٨-٣ دورة عامة لمغذٌ توضح الحركة من الطور الحيوي إلى الطور غير الحيوي.

### ٣-٣ دورات المغذيات

تبين **دورات المغذيات Nutrient cycles** الحركة الأساسية وإعادة تدوير العناصر اللازمة للكائنات الحية للعيش والنمو. ربما تكون دورتا الكربون والنيتروجين هما الأكثر شهرة والأكثر فهماً ووضوحاً، لكن العديد من العناصر الأخرى مهمة أيضاً، وتشمل الفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم. وكل عنصر من هذه العناصر دور حيوي مختلف داخل الكائنات الحية. فالنيتروجين يستخدم لتكوين الأحماض الأمينية والبروتينات وDNA، والمغنيسيوم لتكوين الكلوروفيل وهو ضروري لعملية التمثيل الضوئي. ويستخدم الكالسيوم لتكوين العظام والأصداف والهيكل المرجاني، والفسفور لتكوين العظام وDNA؛ أما الكربون فيوجد في جميع المركبات. لجميع دورات المغذيات طور حيوي وطور غير حيوي (الشكل ٨-٣). ينتقل **المغذي Nutrient** من الطور غير الحيوي إلى الطور الحيوي عندما تمتسه المنتجات وتقوم **بتمثيله غذائياً Assimilation**.

## الطور الحيوى

في دورة الكربون يتم تثبيت ثاني أكسيد الكربون (جزيء غير عضوي يمثل جزءاً من الطور غير الحيوى) خلال عملية التمثيل الضوئي إلى الجلوكوز. ويمكن تحويل الجلوكوز لاحقاً إلى الجزيئات الأخرى التي يحتاج إليها الكائن الحي المنتج (على سبيل المثال النشا). وبذلك يكون قد تم تمثيله غذائياً وأصبح الآن جزءاً من الطور الحيوى. تنتقل المغذيات خلال الطور الحيوى من كائن حي إلى آخر عن طريق التغذية، لذا تنتقل المغذيات على طول السلسلة الغذائية من المنتجات إلى المستهلكات. كما يفقد كل كائن حي بعض هذه المغذيات عن طريق التبرز والإخراج، وبعضها الآخر يبقى داخل المركبات العضوية حتى يموت الكائن الحي. توجد المغذيات في هذا الطور الحيوى من الدورة على شكل مركبات عضوية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.

## الطور غير الحيوى

تفتكك محللات الكائنات الحية بعد الموت، الأمر الذي يؤدي إلى عودة المغذيات إلى حالتها غير العضوية والطور غير الحيوى من الدورة. وتكون المغذيات خلال هذا الطور من الدورة على عدة أشكال:

- أيونات ذاتية في الماء (على سبيل المثال:  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$ ,  $\text{NO}_3^-$ ).
- غازات في الغلاف الجوى (على سبيل المثال:  $\text{CO}_2$ ).
- رواسب يمكن أن تتحول فيما بعد إلى صخور.

تستخدم العناصر الأساسية لتكوين جزيئات ومركبات كبيرة في الكائنات الحية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون (الجدول ٣-٣).

نوع المركب	العناصر الأساسية	الاستخدامات الحيوية في الكائنات الحية
الكربوهيدرات	الكربون، الهيدروجين، الأكسجين	الطاقة (على سبيل المثال، الجلوكوز، النشا) أو تركيبة (على سبيل المثال السليولوز)
البروتينات	الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، الكبريت	الإنزيمات، الهرمونات، أجزاء من العظام، العضلات، الدم في الحيوانات، البروتينات الناقلة في جدران الخلايا النباتية
الدهون	الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، وغيرها	تخزين الطاقة، العزل، الحماية، أغشية الخلية، الهرمونات

الجدول ٣-٣ كيفية استخدام المغذيات في الكائنات الحية.

### مصطلحات علمية

**المغذي Nutrient**: مادة كيميائية تحتاج إليها الكائنات الحية لتتمو وتصلح الخلايا والأنسجة التالفة، وإطلاق الطاقة، أو لعملية الأيض.

**التمثيل الغذائي Assimilation**: تحول المغذي إلى شكل قابل للاستخدام يمكن دمجه في أنسجة الكائن الحي.

## دراسة حالة ١-٣



الصورة ٧-٣ نسر يصطاد سمكة سلمون.

تعود المركبات العضوية الناتجة من تحلل سمك السلمون مرة أخرى إلى التربة لتشكل جزءاً من الدورة الطبيعية للمغذيات، حيث تمتصها جذور الأشجار. على سبيل المثال، غالباً ما تكون النترات عاملاً محدداً لنمو النبات. توفر الأسماك ما يصل إلى 120 kg من النيتروجين لكل هكتار (2.38 فدان) من الغابات، الأمر الذي يساعد الأشجار على النمو ثلاث مرات أسرع مما لو لم تتوافر النترات المضافة. وبهذه الطريقة تتكون حلقة تغذية راجعة إيجابية. فكلما زادت أعداد سمك السلمون في الماء، نمت الأشجار بشكل أفضل، وأصبحت الظروف في مجاري المياه ملائمة لوضع بيض السلمون.

تأثيرات ذلك مهمة للمحافظة على كل من سمك السلمون والغابات حيث يساعد كل منهما الآخر للبقاء على قيد الحياة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي كانت هناك حالات انخفاض حادة في أعداد سمك السلمون في المحيط الهادئ. لذا تجب حماية الغابات لحفظها على الجماعة الأحيائية للسلمون، ويجب أن يكون وضع البيض لسمك السلمون كافياً كل سنة لحفظها على الغابات.

### أسئلة

- ١.١. اشرح سبب أهمية نمو الأشجار لبقاء سمك السلمون.
- ١.٢. اشرح كيف يساعد سمك السلمون على زيادة نمو الأشجار.
٢. اقترح نوع كائن حي، غير الأشجار، يمكن أن يستفيد من المغذيات في جسم السلمون.
٣. افترض أنك تعمل في مجال صون البيئة، اشرح ما إذا كنت ستببدأ بالحفاظ على الغابات أم السلمون. فسر إجابتك.

### أهمية السلمون في نمو الأشجار

يمثل الحصاد الذي يقوم به الإنسان طريقة مهمة لإزالة المغذيات من البيئة البحرية، ومع ذلك تتم إزالتها أيضاً عن طريق هجرة الكائنات الحية البحرية مثل السلمون إلى مناطق المياه العذبة، حيث تأكلها المفترسات مثل الدببة والنسور.

يعود السلمون كل عام إلى مجاري المياه العذبة والبحيرات التي ولد فيها للتكاثر (الصورة ٦-٢). ولن يكون التكاثر ناجحاً، تحتاج مجاري المياه إلى ظلال الأشجار حتى لا تكون المياه دافئة جداً، لأن المياه الدافئة تحتوي على كمية أقل من الأكسجين، وبالتالي تقل أعداد البيوض القادرة على البقاء. كما تساعد الأشجار على منع تعرية التربة وتنمنع الرواسب من الدخول إلى مجاري المياه وتحافظ على صفاء المياه للسلمون، كما تعيش على الأشجار جماعات أحiciaة كبيرة من الحشرات توفر الطعام لصفار السلمون عند تفقيسها، لذلك، فالأشجار مهمة لبقاء السلمون.



الصورة ٦-٣ سلمون المحيط الهادئ يتحرك نحو أعلى النهر لوضع البيض.

أصبح واضحاً أن ليس سمك السلمون فقط يحتاج إلى الأشجار، فالأشجار بدورها تحتاج إلى سمك السلمون أيضاً. وأنشاء تحرك الملائين من سمك السلمون عبر مياه الساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ من الولايات المتحدة توفر هذه الأسماك كميات هائلة من الطعام للدببة والنسور (الصورة ٧-٣). ويقدر أن كل دب في كولومبيا البريطانية، على سبيل المثال، يمكن أن يصطاد 700 سمكة سلمون أثناء فترة وضع البيض (التكاثر). وعلى الرغم من أن الدببة تصطاد السلمون في الماء، إلا أنها تتناول طعامها بعيداً، ولذلك فإنها تأكل نصف ما تصطاده، في حين تأكل الأنواع القمامنة والحشرات النصف الآخر.

## الخزانات في دورات المغذيات

الخزان جزء من الطور غير الحيوي في دورة المغذيات، حيث يمكن للمغذيات القابلة للذوبان في الماء البقاء لفترات طويلة من الزمن، والمحيط خزان مهم للعديد من العناصر. يمثل **زمن البقاء Residence time** متوسط الزمن الذي يستغرقه مكوث جسيم في نظام ما. يميل متوسط زمن بقاء الأيونات المغذية في المحيط لأن يكون طويلاً جداً، لأن بعضها يسقط إلى القاع مع البراز أو الكائنات الميتة حيث تبقى في الرواسب لآلاف أو حتى ملايين السنين (الجدول ٤-٣).

متوسط التركيز في مياه البحر (ppm)	الأيون
19345.00	الكلوريد
10752.00	الصوديوم
2701.00	الكربونات
1295.00	المغنيسيوم
416.00	البوتاسيوم
145.00	كربونات الهيدروجين
0.50	النترات
0.07	الفوسفات

الجدول ٤-٣ متوسط تركيز بعض الأيونات الذائبة في مياه البحر.

### العمليات التي تجدد خزان المغذيات

توجد خمس عمليات رئيسية تساهم في إمداد الطبقة السطحية للمياه بالمغذيات وتعويض مخزونها، وهي:

- ذوبان غازات الغلاف الجوي في الماء
- **الإخراج Excretion** والتحلل
- التيارات الصاعدة للمياه
- الجريان السطحي
- النشاط التكتوني.

تعتمد الأهمية النسبية لهذه العمليات على كل مغذي. على سبيل المثال، في حالة المغذيات الموجدة بتركيز عالية في الغلاف الجوي، سوف يضيّف الذوبان إلى الخزان أكثر مما يضيّفه الجريان السطحي.

### مصطلحات علمية

\***زمن البقاء Residence time**: متوسط الزمن الذي يستغرقه بقاء جسيم في نظام ما.

**الإخراج Excretion**: عملية التخلص من الفضلات التي تكون منها التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحية.

المغذي	متوسط زمن البقاء / سنوات
الفوسفات (الفسفور)*	100000 - 20000
المغنيسيوم	17000000
كربونات الهيدروجين** (الكريون)*	100000
النيتروجين	2000
البوتاسيوم	1000000

\* في حال وجود المغذي على شكل أيون، يشار إلى العنصر بين قوسين ( ).

\*\* تسمى أحياناً البيكربونات Bicarbonate.

الجدول ٤-٤ زمن البقاء التقريبي لمغذيات مختلفة في المحيط.

إن زمن بقاء المغذيات نفسها في الطبقة السطحية من المحيط تكون قصيرة، لأن الكائنات الحية التي تعيش هناك تستخدمها وتعيد تدويرها باستمرار. لهذا الخزان السطحي أهمية خاصة لأنه يوفر إنتاجية مرتفعة من العوالق النباتية. وبعد شدة الضوء، غالباً ما تكون وفرة المغذيات هي العامل الرئيسي المحدد لنمو المنتجات.

توجد العوالق النباتية في الطبقة السطحية من المحيط حيث يتواجد الكثير من الضوء. ويحدد تركيز المغذيات معدل نموها، وكلما ارتفع معدل نمو العوالق النباتية، يرتفع معدل التمثيل الضوئي، وبالتالي ترتفع الإنتاجية. وكما درست سابقاً، تحدد إنتاجية العوالق النباتية مقدار الطاقة التي قد تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي. وبشكل عام، كميات النيتروجين والفسفور هي عامل

وينتشر في مناطق أخرى المزيد من الغاز إلى الغلاف الجوي مقارنة بما يذوب في الماء، وتسمى هذه المناطق **مصادر Sources**.

بشكل عام، يبقى التركيز الإجمالي عند مستوى التوازن، حيث إن الكمية التي تذوب في المحيط تساوي تلك التي تتم إعادةها إلى الغلاف الجوي عن طريق الانتشار (الشكل ٩-٣).

#### مصطلحات علمية

**مصرف Sink**: منطقة تتصف بفقدان صاف للمواد (على سبيل المثال، حيث يذوب المزيد من الغاز في المحيطات مقارنة مع ما ينتشر إلى الغلاف الجوي).

**مصدر Source**: منطقة تتصف بربح صافٍ من المواد (على سبيل المثال، حيث ينتشر المزيد من الغاز في الغلاف الجوي مقارنة مع ما يذوب في المحيط).

#### ذوبان غازات الغلاف الجوي


يوجد النيتروجين والكربون في الغلاف الجوي للأرض، لذا يسهل ذوبانهما مباشرة في الماء. فالنيتروجين يوجد على شكل  $N_2$ ، والكربون على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$ . وتعتمد كمية الغاز التي قد تذوب في الماء على عدة عوامل تشمل:

- درجة حرارة الماء

- تركيز كل غاز في الغلاف الجوي

- كمية اختلاط الماء على السطح (على سبيل المثال: الأمواج القوية تزيد من اختلاط الماء السطحي).


في بعض المناطق، سيكون هناك الكثير من الغازات الذائبة في الماء مقارنة بتلك التي تنتشر عائدة إلى الغلاف الجوي، تسمى هذه المناطق **مصارف Sinks**.



الشكل ٩-٣ تدفق ثاني أكسيد الكربون إلى داخل وخارج المحيط على مدار السنة. تمثل المناطق الأرجوانية والزرقاء مصارف الكربون، وتمثل المناطق الصفراء والحمراة مصادر الكربون؛ أما المناطق الخضراء فتمثل حالة التوازن بين ثانـي أكسـيد الكـربـونـ الذـائـبـ والمـنـطـلـقـ (N:شـمالـ، S:جنـوبـ، E:شـرقـ، W:غـربـ).

صيد الأسماك يحدث في 5% فقط من المحيط حيث المستويات المرتفعة من التيارات الصاعدة للمياه.

يحدث التيار الصاعد للمياه الساحلية Coastal upwelling عندما تهب الرياح بشكل متوازن مع الشاطئ (الشكل ١٠-٢)، الأمر الذي يؤدي إلى إزاحة طبقة السطح الدافئة عن الشاطئ لتحول محلها المياه الباردة الصاعدة من أعماق المحيط. وإذا تحرك الرياح في الاتجاه المعاكس بحيث تدفع الماء نحو الساحل، فمن الممكن أيضاً أن يحدث تيار هابط للمياه Downwelling، ونتيجة لهذا الهبوط تتم إزالة المغذيات من الطبقات السطحية للمحيطات.



الشكل ١٠-٣ التيار الصاعد للمياه الساحلية الناجم عن الرياح السطحية.

### الجريان السطحي

الجريان السطحي جزء من دورة الماء، حيث يتدفق الماء إلى الجداول والأنهار، ومنها إلى المحيط. خلال دورة الماء يت弟兄 الماء من الأنهار والبحيرات والمحيطات والجداول، ويكتشف إلى سحب في الغلاف الجوي، ومنه يسقط على الأرض على شكل هطول (الوحدة الأولى الشكل ١١-١).

عندما يتدفق الماء من خلال الجريان السطحي باتجاه البحر فإنه يذيب ويُصفي مياه المغذيات من التربة. كما يمكنه أيضاً أن يجمع مواد أخرى مثل مخلفات النفط والمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية ومياه الصرف

### الإخراج والتحلل

الإخراج هو إزالة الفضلات الناتجة من التفاعلات الكيميائية داخل الكائنات الحية. على سبيل المثال، يتم إخراج ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية التنفس من رئيسي الثدييات وخياشيم الأسماك. ويتم إخراج الفضلات النيتروجينية من معظم الكائنات البحرية على شكل يوريا ذاتية في البول (الثدييات) أو أمونيا (الأسماس). وبهذه الطريقة تعود بعض الأيونات المغذية الموجودة في الكائنات الحية إلى الماء.

تتفكك المواد العضوية الميتة وبعض نواتج الإخراج عن طريق المحللات، وهي الفطريات والبكتيريا التي تفرز إنزيمات تهضم الجزيئات العضوية الكبيرة، ثم تمتتص المواد الناتجة. على سبيل المثال، تتفكك البروتينات إلى أحماض أمينية، وتتفكك الكربوهيدرات المعقدة إلى جلوكوز. قد تستخدم المحللات بعد ذلك الجلوكوز للتنفس الذي يعيد ثاني أكسيد الكربون إلى الطبقة السطحية. وتحوّل الأحماض الأمينية إلى أمونيا ونترات بواسطة أنواع أخرى من البكتيريا، لاستخدامها العوالق النباتية بعد ذلك للنمو. التحلل أيضاً عملية مهمة في الطبقات العميقة من المحيط، حيث تتم إعادة المغذيات المترسبة خلال التيار الصاعد للمياه.

### التيارات الصاعدة للمياه

صعود المياه الباردة من أعماق المحيط إلى السطح يسمى التيار الصاعد للمياه Upwelling. تحتوي هذه المياه العميقة على تراكيز أعلى من المغذيات مقارنة بتلك الموجودة على السطح بسبب غرق بقايا الكائنات الحية. لذا، ينزل البراز والكائنات الحية الميتة من الطبقات السطحية إلى الأجزاء العميقة من المحيط، حيث تفككها المحللات لتعود الأيونات المغذية إلى الماء. ترتفع المياه الغنية بالمغذيات، حيث تقوم بتخصيب الطبقات السطحية وزيادة الإنتاجية. وتكون المناطق ذات المستويات المرتفعة من التيارات الصاعدة للمياه الساحلية أكثر إنتاجية، ولديها معدلات صيد عالية من الأسماك ذات الأهمية التجارية. ويقدر أن 25% من

الغذائيًا، فهي تثبت الأيونات غير العضوية في مركبات عضوية صالحة للاستخدام تتغذى عليها المستهلكات. وبهذه الطريقة، تكون المغذيات قادرة على الانتقال على طول السلسلة الغذائية. على سبيل المثال، تأخذ العوالق النباتية أيونات النترات وتستخدمها لتكوين الأحماس الأمينية وبناء البروتينات التي تشكل جزءاً من تركيبها. ثم تتغذى العوالق الحيوانية على العوالق النباتية، وتهضم هذه البروتينات مستخدمة الأحماس الأمينية الناتجة من عملية الهضم لتكوين بروتيناتها الخاصة. كما تأكل الأسماك الصغيرة العوالق الحيوانية وتستمر العملية. تسلك المغذيات مسارات مختلفة عندما تدخل السلسلة الغذائية، فبعضها يفرق في قاع البحر على شكل **ثلج بحري** **Marine snow**، وبعضها يندمج في الشعاب المرجانية، وبعضها يتم إزالته عن طريق الحصاد.

### مصطاحات علمية

**الثلج البحري** **Marine snow**: جسيمات المواد العضوية التي تسقط من الطبقات السطحية إلى عمق المحيط.

### الثلج البحري

الثلج البحري هو الاسم الذي يطلق على جسيمات المادة العضوية التي تسقط من سطح المحيط إلى المياه العميقة. وهو يتكون من براز الكائنات الحية في الطبقات السطحية، وكذلك الحيوانات والعلائق النباتية والعلائق الحيوانية الميتة. وقد سُمي بهذا الاسم لأنه يشبه تساقط الثلج، فهي جسيمات صغيرة بيضاء تطفو في الماء (الصورة ٨-٣).



الصورة ٨-٣ الثلج البحري في الماء.

الصحي، لتنتهي جميعها في المحيط. قد تسبب زيادة المغذيات في الجريان السطحي تكون مناطق بحرية ميتة، وازدهار طحالب ضارة. ستتم مناقشة المناطق البحرية الميتة أثناء دراسة الحالة الموسعة.

### العمليات التكتونية

تضييف العمليات التكتونية المغذيات إلى الماء بطريقتين رئيسيتين: الأولى، من خلال الفوهات المائية الحرارية حيث تذوب المغذيات في الماء أثناء مروره فوق حجرة الماجما (الصهارة البركانية). وعندما يطلق الماء فائق الحرارة من الفوهة ويلتقي مياه البحر الباردة، تترسب بعض الأيونات المعدنية وتكون المدخنة الصلبة. لكن تبقى العديد من المعادن الضرورية للحياة ذاتية في الماء، وتكون متاحة للكائنات الحية التي تعيش عند الفوهات. وهذا مهم بشكل خاص لعمليات التمثيل الكيميائي التي تستخدم الكبريتيدات Sulfides. وبدون ذلك لا توجد حياة على هذا العمق الذي لا يصله الضوء. تصل بعض المغذيات المضافة بهذه الطريقة في النهاية إلى الطبقة السطحية عبر التيارات الصاعدة للمياه.

أما الطريقة الأخرى فتتمثل بعمليتي التعرية والتجوية، فهما مهمتان في إضافة المغذيات إلى الخزان في المحيط. كما أن النشاط التكتوني مثل إطلاق الماجما من البراكين وتكوين الجبال يضيفان صخوراً جديدة إلى سطح الأرض. تتعرض هذه الصخور لعمليات التعرية والتجوية، فتذوب المغذيات في ماء المطر وتجري إلى الأنهر والجداول ومنها إلى المحيط.

أظهرت الدراسات أيضًا أن الرماد الناتج من ثوران البراكين يخصب المحيطات ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية الأولية. فعندما يهبط الرماد في الماء تذوب أيونات المعادن مثل الفوسفات والحديد والمغنيسيوم في الماء، وتضاف إلى الخزان.

### العمليات التي تزيل المغذيات من الطبقة السطحية

الطريقة الرئيسية لإزالة المغذيات من الطبقة السطحية هي من خلال قيام المنتجات بامتصاصها وتمثيلها

على سبيل المثال، قد يأكل الإنسان الأسماك ويهضمها، فتخرج بعض المركبات المحتوية على النيتروجين مع البول، والذي ينتهي في مياه الصرف الصحي. وتطلق مياه الصرف الصحي في العديد من المناطق إلى الأنهر والمحيطات بعد أن تعالج جزئياً. وفي بعض المناطق تطلق مياه الصرف الصحي الخام، فتعود وبالتالي المركبات المحتوية على النيتروجين الموجودة في الأسماك الأصلية إلى المحيط.

هذا السقوط المستمر للمواد العضوية يوفر الغذاء للعديد من الكائنات الحية التي تعيش في أعماق المحيط. وبعضاها تتغذى عليها بقايا العوالق الحيوانية والأسماك أثناء سقوطها، وبعضاها الآخر تتغذى به المتغذيات بالترشيح على عمق أكبر. والكثير منها لا يؤكل مطلقاً بل يشكل جزءاً من رواسب قاع المحيط. بعض المغذيات في الرواسب يتم تحريرها بعمليات مثل التعرية والذوبان، ويبقى بعضها الآخر في الرواسب لسنوات عديدة.

### أسئلة

٩. أ. صف المقصود بالمصطلحين: حيوي وغير حيوي، في سياق دورات المغذيات.  
 ب. اشرح كيفية انتقال المغذيات من الطور غير الحيوي إلى الطور الحيوي من دورة مغذٍّ.
١٠. أ. صف كيفية انتقال المغذيات في الطور الحيوي من الدورة.  
 ب. اذكر مكانين تجد فيها أيونات مغذية ضمن الطور غير الحيوي من دورة المغذيات.
١١. اشرح سبب أهمية الحصاد في دورات المغذيات البحرية، واسرح ما إذا كنت تعتقد أنه مفيد أو ضار.

### الحصاد

يتمثل الحصاد Harvesting بإزالة الإنسان للأنواع البحرية. فوفقاً لأرقام أحدث تقارير الأمم المتحدة، بلغ إجمالي الأسماك التي جرى صيدها في سنة 2016 م، 90.9 مليون طن. ويشمل هذا الرقم أنواعاً حيوانية أخرى غير الأسماك كالقشريات مثل السرطانات وجراد البحر، والرخويات مثل بلح البحر والحبار. ويمكن أيضاً حصاد الطحالب الكبيرة مثل الأعشاب البحرية لاستخدامها في صناعة الأغذية وفي تصنيع المواد الهلامية والأسمدة. وتم إزالة جميع المغذيات الموجودة في هذه الأنواع عند حصادها من المحيط. ومع ذلك، يعود العديد منها في النهاية إلى المحيط عبر الدورة الطبيعية لهذه المغذيات.

### مشروع: رسوم كرتونية للعلاقات البحرية

- هل يفهم أي طالب لم يدرس هذه الوحدة المقصود من الرسم الكرتوني.
  - أي الكائنين يستفيد أو يتضرر؟ ولماذا؟
  - هل النظر إلى العلاقة في الرسم الكرتوني يثير الاهتمام؟
- أعط المجموعة الأخرى درجة من درجة كلية من 20، بحيث تعطى 5 درجات لكل سؤال. اكتب عن أمر واحد أعجبك فعلاً، واقتصر نصيحة واحدة لتحسينه.

من خلال العمل في مجموعات صغيرة صمم رسوماً كرتونية توضح العلاقة بين كائنين حيَّين بحرَّيْن. يجب أن يكون نوع العلاقة مما عرضته الوحدة (على سبيل المثال، التبادلية)، لكن عليك إجراء بحث لتحديد المثال الذي تختاره. يجب أن تظهر الرسوم الكرتونية نوع العلاقة وكيف تؤثر على كلا الكائنين الحيَّين، ويفضل أن تكون بطريقة مثيرة للاهتمام أو إبداعية.

### التفكير في المشروع

على كل مجموعة أن تطلع على رسم كرتوني آخر (المجموعة أخرى)، وتفكر في الأسئلة الآتية:


- هل تم شرح نوع العلاقة؟

## دراسة حالة موسعة

### المنطقة الميتة في خليج المكسيك



الشكل ١١-٣ خليج المكسيك والبلدان المحيطة.



الشكل ١٢-٣ أعداد المناطق الميتة على امتداد العقود.

وقد تتكون المناطق الميتة أيضاً بشكل طبيعي عندما تؤدي التغيرات في الرياح والتيارات إلى تغير تدفق المغذيات صعوداً من مياه الأعماق.

تسبب المغذيات عند دخولها إلى الماء زيادة كبيرة في نمو الطحالب ما يؤدي إلى ازدهارها. وتسبب الفوسفات والنترات زيادة نمو البكتيريا الخضراء المزرقة، التي لا تتغذى عليها العديد من العوالق الحيوانية، ما يعني

خليج المكسيك حوض تحيط به الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا (الشكل ١١-٣). عرضه 1500 km تقريباً، ويحصل بكل من المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي. المنطقة الميتة من الماء أصبحت فيها مستويات الأكسجين منخفضة جداً، الأمر الذي يعني عدم وجود ما يكفي من الأكسجين للتنفس، وبالتالي، إما أن تموت الكائنات الحية أو أن تنتقل إلى منطقة أخرى تكون فيها مستويات الأكسجين مرتفعة. توجد المناطق الميتة بالقرب من السواحل حيث مستويات عالية من المغذيات التي يتم جرفها من الأراضي الزراعية. جرى الإبلاغ عن أول منطقة ميتة في أوائل القرن العشرين، وتزايدت الأعداد كل عام منذ ذلك الحين (الشكل ١٢-٣). ويقدر أن المستوى العام للأكسجين في المحيط انخفض بين سنتي 1950 و 2018 بمقدار 77 مليار طن.

#### تكون المناطق الميتة

تتكون المناطق الميتة عندما تدخل المغذيات إلى الماء مثل الفوسفات والنترات، والتي تأتي بشكل رئيسي من الأسمدة الكيميائية والفضلات مثل مياه الصرف الصحي.

(تابع)

تكون المياه العذبة التي تتدفق إلى الخليج من نهر المisisipi أقل كثافة من مياه البحر، فتشكل طبقة في الأعلى. وهذا يعني أن المياه العميقه حيث يحدث نقص الأكسجين قد تم عزلها عن التزود بالأكسجين من الغلاف الجوي. وبالتالي تبقى المنطقة الميّة حتى يمترّج الماء مرة أخرى، بفعل إعصار ما أو عندما تتشكل الجبهات الباردة في الخريف والشتاء.

### تأثيرات المنطقة الميّة

صناعة المأكولات البحرية في خليج المكسيك مهمة جداً، إذ يزور الخليج الولايات المتحدة بغالبية المحار والروبيان المستزرع، فضلاً عن كونه مصدراً لعدة أنواع من الأسماك. وتقدر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن صناعي السياحة وصيد الأسماك تكلف المنطقة الميّة 82 مليون دولار سنوياً. فعندما تغادر الأسماك المنطقة الميّة بسبب نقص الأكسجين، يضطر الصيادون إلى الانتقال مسافةً بعيداً لصيدها، وهذا يكلف الوقت والمال. غالباً ما لا يكون الروبيان قادرًا على الهرب من المنطقة الميّة، فيموت، الأمر الذي يقلل من عدد أفراد جماعتها الأحيائية، ويصعب صيدها في المستقبل.

### تقليل حجم المنطقة الميّة

الطريقة الرئيسية لتقليل حجم أي منطقة ميّة هي تقليل مستوى المغذيات التي تدخل الماء. ففي سنة 1997 م تشكلت فرقة العمل المعنية بالمغذيات لمجموعات المياه في خليج المكسيك بهدف تقليل متوسط حجم المنطقة الميّة إلى  $5000 \text{ km}^2$ . وتشمل الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها تقليل استخدام الأسمدة غير العضوية في المزارع، وتغيير توقيت استخدامها للحد من ترشيحها وجرفها بفعل مياه الأمطار. إن إدارة سهول الفيضانات مهمة، لأن زيادة مساحة هذه السهول تعني أن كمية مياه الفيضانات التي تنتقل إلى الخليج سوف تختفي، وتحتجز الرواسب الغنية بالمغذيات. وقد تشجع المزارعون على عدم تجفيف الأراضي الرطبة، وتركها في حالتها الطبيعية لتحسين نوعية التربة وتقليل التعرية. ويجري تحسين عمليات معالجة الفضلات لتجنب تصريف المغذيات إلى الماء، وتجنب دخول فضلات الحيوانات إلى مجاري المياه نهائياً.


تراكم أعدادها بلا حدود. وعندما تموت الكائنات الحية تهبط إلى القاع، لتتوفر مصدراً غذائياً للبكتيريا التي تفككها في عملية التحلل. تزداد أعداد البكتيريا بسرعة، ويستهلك تفاسها معظم الأكسجين الذائب في الماء، فيحدث بذلك نقص الأكسجين في الماء وتموت الكائنات الحية الأخرى.

### خليج المكسيك

تشير المنطقة الميّة في خليج المكسيك الاهتمام لسبعين: الأول أنها ثاني أكبر منطقة ميّة في العالم، والسبب الثاني أن حجمها يتغير موسمياً بحسب ظروف الطقس كل سنة. يصب نهر المisisipi في الخليج ويتصف بأكبر حوض نهر في أمريكا الشمالية، كما أن مستويات المغذيات التي يجريها النهر معه كبيرة. بالمقابل، يعيش أثنا عشر مليون إنسان في المناطق المحاذية لنهر المisisipi، ويطلقون مياه الصرف الصحي المعالجة فيه. معظم الأراضي القريبة من نهر المisisipi هي أراضٍ زراعية، لذا تجريف مياه الأمطار الأسمدة باستمرار، وبالتالي يصل 1.7 مليون طن من المغذيات كل سنة إلى خليج المكسيك من هذا النهر.

يسبب فصل الربيع والصيف ازدهار الطحالب وتكوين المنطقة الميّة التي تختلف مساحتها، وتبلغ في المتوسط  $13000 \text{ km}^2$ . وقد سجلت أكبر منطقة ميّة في سنة 2017 م، عندما بلغت  $22730 \text{ km}^2$ .

ومن المثير للاهتمام أن المنطقة الميّة عادت إلى المساحة المتوسطة بعد مرور سنة، خلال صيف 2018 م. تكون المنطقة الميّة كبيرة جداً أثناء الفيضانات الغزيرة، وقد اختفت هذه المنطقة في آواخر صيف 1998 م لحدث جفاف شديد وانخفاض كمية المياه الداخلة إلى الخليج بشكل ملحوظ. يبيّن الشكل (١٣-٣) مساحة المنطقة الميّة في سنة نموذجية ذات ظروف مناخية عادية.



الشكل ١٣-٣ متوسط المساحة لمنطقة ميّة في سنة 2018 م.

### (تابع)

- |  |  |
|--|--|
| <p>٤. اشرح: لماذا المنطقة الميّة لخليج المكسيك موسمية؟</p> <p>٥. لخص التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتقليل حجم المنطقة الميّة لخليج المكسيك، وارجح كيفية عمل كل تدبير.</p> | <p>أسئلة</p> <p>١. صف واشرح كيف تتكون المنطقة الميّة.</p> <p>٢. اقترح سبب تزايد المناطق الميّة منذ اكتشافها لأول مرة.</p> <p>٣. اشرح سبب تغير حجم المنطقة الميّة لخليج المكسيك كل سنة.</p> |
|--|--|

### ملخص

قد تشمل التفاعلات بين الكائنات الحية التكافل، وهو علاقة بين كائنين حيّين أو أكثر من أنواع مختلفة تعيش قريبة بعضها من بعض.	
قد يكون التكافل شكلاً من أشكال التطفل (مجدافيات الأرجل والأسماك البحرية)، أو التعايش (أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا)، أو التبادلية (سرطان البحر الملائم وشقائق النعمان).	
تدخل الطاقة إلى النظام البيئي من خلال عملية ثبيت الكائنات الحية ذاتية التغذية للكربوهيدرات. ترتبط الإنتاجية الأولية للنظام البيئي بكلمة الطاقة المستهلكة في الكربوهيدرات.	
قد تقوم الكائنات الحية ذاتية التغذية بعملية التمثيل الضوئي أو التمثيل الكيميائي. تحتاج الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الضوئي (الكائنات الحية ذاتية التغذية الضوئية) إلى ضوء الشمس، وتحدث فقط في الطبقة الضوئية من المحيط. تستخدم الكائنات الحية التي تقوم بعملية التمثيل الكيميائي (الكائنات الحية ذاتية التغذية الكيميائية) المواد الكيميائية الذائبة بالقرب من الفتحات المائية الحرارية في أعماق المحيط.	
الكائنات الحية غير ذاتية التغذية مستهلكة وهي تتغذى على الكائنات الحية ذاتية التغذية أو غيرها من الكائنات الحية غير ذاتية التغذية.	
يمكن عرض علاقات التغذية على شكل سلاسل غذائية أو شبكات غذائية، ويمكن وصف الكائنات الحية في السلاسل الغذائية أو الشبكات الغذائية بأنها آكلات أعشاب، أو آكلات لحوم، أو قارنة، أو مفترسة وفرائس.	
تقوم المحللات بتفكيك المواد العضوية الميّة لتعيد المغذيّات إلى البيئة كي تستخدمنها الكائنات الحية ذاتية التغذية مرة أخرى.	
عند كل مستوى غذائي يتم فقدان الطاقة تعود إلى النظام البيئي من خلال فقدان الحرارة أثناء التنفس والفضلات الناتجة والطاقة المستخدمة في العمليات الحيوية. لا تستخدم هذه الطاقة لزيادة الكتلة الحيوية، ولا تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي.	
يمكن توضيح علاقات التغذية من خلال أهرامات الأعداد والكتلة الحيوية والطاقة.	
تنتقل المغذيّات عبر النظام البيئي في دورات مثل دورة الكربون ودورة النيتروجين.	
يتمثل الطور الحيوي لدورات المغذيّات بتمثيل هذه المغذيّات في المواد العضوية في الكائنات الحية، ومرورها عبر النظام البيئي في السلاسل الغذائية. للمغذيّات أدوار حيوية مهمة، مثل تكوين DNA والبروتينات والكريبوهيدرات والكلوروفيل والعظام والأصداف.	
يتمثل الطور غير الحيوي لدورات المغذيّات بإذابة المغذيّات في الماء، أو وجودها على شكل غاز في الغلاف الجوي، أو تخزينها في الرواسب أو الصخور التي تشكل أحياناً خزانات من المغذيّات المتاحة للمنتجات. يمكن تجديد مخزون المغذيّات في هذه الخزانات عن طريق الغازات الذائبة في الماء من الغلاف الجوي، والإخراج، والتحلل، والتيارات الصاعدة للمياه، والجريان السطحي والنشاط التكتوني.	
يمكن إزالة المغذيّات من الطبقة السطحية للمحيطات من خلال الثلج البحري والمحاصد.	

## أسئلة نهاية الوحدة

- ١ أي من الآتي يمثل العلاقة بين مجدافيات الأرجل والأسماك البحريّة؟
- [1] د. افتراس      ج. تعايش      ب. تبادل      أ. تطفل
- ٢ أي من الآتي يصف التمثيل الكيميائي؟
- أ. العملية التي تستخدم المستهلكات عبرها المواد الكيميائية المستخلصة من الغذاء لإنتاج الكتلة الحيوية.
- ب. العملية التي يتم عبرها استخدام الطاقة الكيميائية في جزيئات الماء لإنتاج جزيئات عضوية قابلة للاستخدام من قبل المنتجات.
- ج. العملية التي يتم عبرها استخدام الطاقة الحرارية من الفوهات المائية الحرارية في عملية التمثيل الضوئي عند البكتيريا في الأعماق.
- د. العملية التي يتم عبرها استخدام الطاقة الكيميائية الموجودة في كبريتيد الهيدروجين لإنتاج جزيئات عضوية في المنتجات.
- [1]

- ٣ ما هو الثلج البحري؟
- أ. مياه باردة وكثيفة تغوص من الطبقات السطحية إلى عمق المحيط.
- ب. جسيمات المواد العضوية التي تسقط من الطبقات السطحية إلى عمق المحيط.
- ج. جسيمات المواد غير العضوية التي تسقط من الطبقات السطحية إلى عمق المحيط.
- د. التربس الذي يحصل في المحيطات في مناطق مناخية باردة مثل المنطقة القطبية.
- [1]


- ٤ [3]
- أ. اشرح المقصود بمصطلح الإنتاجية.
- ب. اذكر ثلاثة عوامل قد تؤثر على الإنتاجية.
- [3]

[المجموع: 6]

- ٥ [4]
- أ. صُف عملية التمثيل الضوئي.
- ب. اشرح: لماذا لا تحدث عملية التمثيل الضوئي في الفوهات المائية الحرارية على قاع المحيط؟ [2]
- ج. تبلغ الطاقة الشمسية الساقطة على المحيط  $(10^6 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}) \times 1.7 = 18754 \text{ kJ/m}^2 \text{ year}$  و تستطيع العوالق النباتية استخدام [3]
١. احسب النسبة المئوية لطاقة الشمس التي تستخدمها العوالق النباتية. وضح خطوات الحل. [2]
  ٢. اشرح سبب عدم استخدام النسبة 100% من الطاقة.
- [المجموع: 11]

٦

ادرس التمثيل البياني في الشكل ١٤-٣ الذي يوضح النسبة المئوية لتركيز الكلوروفيل على ساحل كاليفورنيا على مدار سنة واحدة.



الشكل ١٤-٣ تراكيز الكلوروفيل التقريبية على ساحل كاليفورنيا في سنة واحدة.

- [3] أ. صف الأنماط التي يظهرها التمثيل البياني.
  - [5] ب. اشرح سبب زيادة كمية الكلوروفيل في شهر مارس.
  - [2] ج. اقترح واشرح ما سيحدث للجامعة الأحيائية للعوالق الحيوانية في شهري مارس وأبريل.
  - د. يتغذى سمك الرنجة داخل هذا النظام البيئي على العوالق الحيوانية، ويتغذى سمك الماكريل على الرنجة. يوجد 809 من العوالق النباتية، 37 من العوالق الحيوانية، 11 من سمك الرنجة، 1 من سمك الماكريل. ارسم هرم الأعداد لهذه السلسلة الغذائية.
- [المجموع: 13]

٧

- ١. صف كيف تدخل المياه الغنية بالمغذيات القادمة من أعماق المحيط خزان المغذيات على السطح.
  - ٢. اذكر طريقتين آخرتين تدخل بهما المغذيات الطبقات السطحية.
  - ب. ١. اشرح فائدة زيادة المغذيات في الطبقات السطحية.
  - ٢. اشرح كيف تكون زيادة المغذيات في الطبقات السطحية ضارة.
  - ج. اذكر مثلاً على عنصر أساسي تحتاج إليه الكائنات الحية، واذكر الغرض الذي يستخدم فيه.
- [المجموع: 10]

(تابع)

٨

- أ. اشرح كلاً من المصطلحين الآتيين مع ذكر أمثلة عليهما، ثم صف دور كل كائن حي في علاقة التغذية:

[3]

[3]

[3]

[المجموع: 9]


١. التطفل.

٢. التعايش.

- ب. ما أوجه الاختلاف بين المنتجات والمستهلكات.

٩

- ادرس التمثيل البياني ١٥-٣ والذي يمثل الكتلة الحيوية للعوالق النباتية والعوالق الحيوانية حول الساحل النرويجي على مدار السنة.



الشكل ١٥-٣ الكتلة الحيوية للعوالق النباتية والعوالق الحيوانية حول الساحل النرويجي على مدار السنة.

- أ. ارسم هرم الكتلة الحيوية رسمًا تقريريًا لإظهار العوالق النباتية والعوالق الحيوانية في شهر مارس.

[2]

[3]

[2]

[1]


[المجموع: 8]

ب. اشرح سبب نقص الكتلة الحيوية في المستهلكات مقارنة بالكتلة الحيوية في المنتجات.

ج. صف كيف سيختلف هرم الكتلة الحيوية في شهر يوليو.

د. اشرح سبب اختلاف هرم الكتلة الحيوية في شهر يوليو.

يوضح الشكل ١٦-٣ سلسلة غذائية من نظام بيئي بحري. توضح الأرقام مقدار الطاقة في كل مستوى غذائي في الشتاء بوحدات تقديرية.



الشكل ١٦-٣ سلسلة غذائية من نظام بيئي بحري توضح مقدار الطاقة في كل مستوى غذائي بوحدات تقديرية.

أ. احسب النسبة المئوية للطاقة المنتقلة بين العوالق النباتية والعلائق الحيوانية. وضح خطوات حلّك.

[2]

ب. اشرح سبب وجود مقدار طاقة أقل في المستهلكات منها في المنتجات.

ج. ١. اقترح ما سيحدث للطاقة في كل مستوى غذائي خلال الصيف.

٢. اقترح ما يمكن أن يحدث للسلسلة الغذائية في حالة تصريف الأسمدة من الأرضي الزراعية الساحلية إلى المياه.

[3]

[المجموع: 11]

أ. انقل الجدول ٦-٣ وأكمله لتوضيح استخدامات المغذيات المختلفة.

١١

المغذي	الاستخدام الحيوي
النيتروجين	
الكالسيوم	
الفسفور	

الجدول ٦-٣ استخدامات المغذيات المختلفة.

ب. ١. صف عملية الجريان السطحي.

٢. صف تأثير جريان الأسمدة النيتروجينية على المنتجات.

٣. اشرح كيف سيؤثر هذا على المستهلكات في السلسلة الغذائية.

[المجموع: 11]

## قائمة تقييم ذاتي

بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول الآتي.

أرجح الموضوع	واثق من الاستمرار	أقرب من تحقيق الهدف	احتاج إلى بذل المزيد من الجهد	أستطيع أن
١-٣				أعرّف المصطلحات الآتية: التطفل، والتعايش، والتبادل، وأذكر أنها كلها أمثلة على العلاقات التكافعية.
١-٣				أصف العلاقة التطفلية بين مجدافيات الأرجل والأسماك البحريّة.
١-٣				أصف العلاقة التعايشية بين أسماك شيطان البحر وأسماك الريمورا.
١-٣				أصف العلاقة التبادلية بين سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان.
٢-٣				أشرح أن المنتجات يمكن أن تكون كائنات حية تقوم بالتمثيل الصوّي أو التمثيل الكيميائي.
٢-٣				أعرّف الإنتاجية بأنها معدل إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة مساحة أو حجم لكل وحدة زمنية، وأشرح كيف يمكن أن تؤثر الإنتاجية الأولى العالية على السلسلة الغذائية.
٢-٣				أحسب وأفسر فقدان الطاقة على طول السلسلة الغذائية
٢-٣				أرسم وأصف وأفسر أهرامات الأعداد والكتلة الحيوية والطاقة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الطفيليّات وفترات ازدهار العوالق النباتية مثل ازدهار الطحالب.
٣-٣				أعرّف المغذي على أنه مادة يحتاج إليها الكائن الحي للنمو أو الإصلاح أو الطاقة أو الأيض الطبيعي.
٣-٣				<p>أشرح أن بعض المغذيات تزوّد الكائنات الحية بمصدر للعناصر الأساسية وأن هذه العناصر لها أدوار حيوية مهمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• النيتروجين الذي يستخدم في تكوين البروتينات و DNA</li> <li>• الكربون الذي يستخدم في تكوين كافة المركبات العضوية</li> <li>• المغنيسيوم الذي يستخدم في تكوين الكلوروفيل</li> </ul>

(تابع)

أرجح الموضوع	واثق من الاستمرار	اقترب من تحقيق الهدف	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	أستطيع أن
٣-٣				<ul style="list-style-type: none"> <li>• الكالسيوم الذي يستخدم في تكوين العظام والأصداف والهياكل المرجانية</li> <li>• الفسفور الذي يستخدم في تكوين DNA والعظام.</li> </ul>
٣-٢				أذكر أن المغذيّات يمكن أن تشمل غازات مثل $\text{CO}_2$ وأيونات مثل $\text{Mg}^{2+}$ ، و $\text{CO}_3^{2-}$ و $\text{PO}_4^{3-}$ ، و $\text{NO}_3^-$ ، ومركبات عضوية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات.
٣-٣				أذكر أن بعض المغذيّات قابلة للذوبان، وأن هناك مخزوناً لهذه المغذيّات الذائبة في المحيط وهو متاح للمنتجات والمستهلكات.
٣-٣				أشرح سبب محدودية الإنتاجية بفعل توافر المغذيّات الذائبة.
٣-٣				أشرح العمليات التي يتم من خلالها تجديد مخزون المغذيّات الذائبة، بما في ذلك ذوبان غازات الغلاف الجوي، والإخراج والتحلل، وارتفاع التيارات الصاعدة للمياه، والجريان السطحي، والنشاط التكتوني.
٣-٣				أذكر أن مخزون المغذيّات الذائبة ينضب بسبب امتصاصها بواسطة الكائنات الحية.
٣-٣				الشخص كيف ينقل الثلج البحري المواد العضوية التي تحتوي على الطاقة من المياه السطحية إلى عمق المحيط.
٣-٣				أشرح أن المغذيّات التي تمتصها الكائنات الحية في السلسل الغذائية يمكن إزالتها عن طريق الحصاد.

The background of the slide features a dense underwater kelp forest. The plants have long, thin, ribbed leaves and thick, brownish trunks. Sunlight filters down from the surface in bright rays, creating a dappled light effect through the green and yellowish canopy.

الوحدة الرابعة <

# التصنيف

## Classification

### أهداف التعلم

- ١٤- يلُّخص وظائف الخياشيم، والغطاء الخيشومي، والخط الجانبي المرئي من الخارج، والحراسف، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والهيكل العظمي، ومثانة العوم في الأسماك العظمية البالغة النموذجية.
- ١٥- يلُّخص الأهمية البيئية والاقتصادية للأسماك العظمية، بما في ذلك سمكة الأنشوجة البيروفية.
- ١٦- يصف ويحدد السمات الداخلية والخارجية الرئيسية لسمكة غضروفية باللغة نموذجية، بما في ذلك الهيكل الغضروفوي، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والسنينات، والخط الجانبي، والخياشيم، والشقوق الخيشومية.
- ١٧- يلُّخص وظائف الهيكل الغضروفوي، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والسنينات، والخط الجانبي، والخياشيم، والشقوق الخيشومية لسمكة غضروفية باللغة نموذجية.
- ١٨- يصف ويحدد السمات الرئيسية للطحالب الكبيرة النموذجية، مثل طحلب الكلب، بما في ذلك المثبت، والستيب، والأنصال والمثانيات الهوائية.
- ١٩- يلُّخص وظائف المثبت، والستيب، والأنصال والمثانيات الهوائية للطحالب الكبيرة النموذجية.
- ٢٠- يلُّخص الأهمية البيئية والاقتصادية للطحالب الكبيرة الحجم، بما في ذلك طحلب الكلب.
- ٢١- يصف ويحدد السمات الرئيسية لنباتات بحري نموذجي، مثل حشائش البحر، بما في ذلك الجذور والرايزومات والأوراق والأزهار.
- ٢٢- يلُّخص وظائف الجذر، والرايزوم، والأوراق، والأزهار لنباتات بحري نموذجي.
- ٢٣- يلُّخص الأهمية البيئية والاقتصادية للنباتات البحرية، بما في ذلك حشائش البحر.
- ١- يصف تصنيف الأنواع في التسلسل الهرمي التصنيفي للنطاق والمملكة والشعبة والطائفة والرتبة والعائلة والجنس والنوع.
- ٢- يصف ويستخدم نظام التسمية الثنائية لتسميات الأنواع.
- ٣- يضم ويستخدم مفاتيح التشبيب الثنائية البسيطة التي تعتمد على سمات يمكن تحديدها بسهولة.
- ٤- يسجل ملاحظات وينفذ رسومًا بيولوجية من عينات أو صور فوتوغرافية لكتائن بحرية رئيسية.
- ٥- يعرف العوالق على أنها مجموعة متنوعة من الكائنات الحية المجهرية بشكل عام والتي لديها قدرة محددة على الحركة، وتتجرب مع التيارات المائية.
- ٦- يصف العوالق النباتية كمنتجات تمتص المغذيات من بيئتها وتحصل على غذائها بواسطة عملية التمثيل الضوئي؛ وتشمل الطحالب المجهرية مثل الدياتومات والسوطيات الدوارة.
- ٧- يذكر أن العوالق الحيوانية هي مستهلكات؛ ومنها اليرقات ومجدافيات الأرجل وحيوانات كبيرة مثل قنديل البحر.
- ٨- يصف ويحدد السمات الرئيسية لشوكيات الجلد النموذجية البالغة، والتي تقتصر على التمثال الخماسي والأقدام الأنبوية.
- ٩- يلُّخص وظائف الأقدام الأنبوية في شوكيات الجلد النموذجية البالغة.
- ١٠- يلُّخص الأهمية البيئية والاقتصادية لشوكيات الجلد، بما في ذلك نجم البحر المكلل بالأشواك.
- ١١- يصف ويحدد السمات الرئيسية للقشريات البالغة النموذجية، بما في ذلك الدرع، والبطن المجزأة، والأرجل المفصليّة وزوجان من قرون الاستشعار.
- ١٢- يلُّخص وظائف الدرع، والأرجل المفصليّة في القشريات البالغة النموذجية.
- ١٣- يصف ويحدد السمات الداخلية والخارجية الرئيسية لسمكة عظمية باللغة نموذجية، بما في ذلك الخياشيم، والغطاء الخيشومي، والخط الجانبي المرئي من الخارج، والحراسف، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية) والهيكل العظمي، ومثانة العوم.

## قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة

- أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها. شارك نتائجك مع مجموعة أخرى، واطلب إليهم ما إذا كان بإمكانهم إضافة مثال إلى كل مجموعة من مجموعاتك.
٢. يتفاعل البشر مع البيئة البحرية بطرق مختلفة. اكتب قائمة بالطرق التي تجعل المحيط مفيداً للإنسان. قارن قائمتك مع زميلك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك إضافة أي شيء آخر.

١. اعمل في مجموعات صغيرة، مستخدماً استراتيجية العصف الذهني لمدة دقيقة واحدة لتحديد أكبر عدد ممكن من المواطن البيئية البحرية المختلفة. قارن نتائجك بنتائج مجموعة أخرى، ثم أضف أي اقتراحات لم تطرّق إليها. كرر التمرين واستخدم استراتيجية العصف الذهني لمدة دقيقة واحدة لتحديد أكبر عدد ممكن من الأنواع البحرية التي يمكنك التفكير فيها. ثم، على ورقة كبيرة، وزّعها في مجموعات بناءً على

## العلوم البيئية ضمن سياقها

## علمنا المائي

تصنيف الكائنات الحية البحرية دراسة مثيرة للاهتمام، حيث ينظر العلماء عن كثب إلى الخصائص المشتركة والميزات الفريدة.

التصنيف ضروري لتحديد الأنواع والتواصل. إذا عدت من العطلة وزعمت أنك سبحت مع أسماك القرش، فإن معظم الناس لن يصدقوا كلامك، لأن مخايلتهم تحفظ بصورة قاسية عن سمكة القرش. ومع ذلك، فإن السباحة مع القرش الأبيض الكبير، الذي يبلغ طوله أربعة أمتار، تختلف تماماً عن السباحة مع القرش الفانوس القزم (Dwarf lanternshark)، الذي يبلغ طوله 16 cm وحجمه لا يزيد عن حجم كفّ اليد! وعلى الرغم من اختلاف هذين النوعين في الحجم، إلا أنهما يشتراكان في العديد من الخصائص، مثل الهيكل العظمي الغضروفي والقشور التي تسمى السنينات (Denticles) الموجودة على جلدهما.

يساعد تصنيف الكائنات الحية أيضاً في محاولات الحفاظ على البيئة. فمن خلال معرفة أعداد الأنواع المختلفة، وما إذا كانت هذه الأنواع آخذة في التزايد أو في الانخفاض، يمكن لعلماء البحار أن يتّخذوا استراتيجيات تساعده في الحفاظ على موائل ونظم إيكولوجية معينة، مثل أشجار المانجوروف المنتجة والحيوية بيئياً، وأحواض حشائش البحر، وغابات طحلب الكلب، والشعاب المرجانية في البحار Seas الضحلة. إن إدراك الأهمية البيئية والاقتصادية لمختلف الأنواع المائية قد يشجع على الاستخدام المستدام للبيئة البحرية لضمان بقائها للأجيال القادمة لاستخدامها والاستمتاع بها.

يبدو كوكب الأرض أزرق من الفضاء، وذلك لأن المياه تغطي أكثر من 70% من سطحه. تُعدُّ المحيطات Oceans وملاداتها البحرية مهمة لجميع أشكال الحياة على الأرض؛ إذ إن المحيطات هي موطن لتنوع بيولوجي هائل من الكائنات الحية. تحتوي محيطات العالم على 99% من المساحة الصالحة للعيش على كوكب الأرض، ويُقدر أن 50-80% من جميع أشكال الحياة على سطح الأرض توجد في البحار والمحيطات. وبما أن نحو 95% من المحيطات لا تزال غير مكتشفة، فإنه يستحيل معرفة العدد الدقيق للأنواع التي تعيش فيها، إلا أن العدد النهائي قد يصل إلى مليون. وقد أظهرت دراسات إحصائية حديثة للحياة البحرية اكتشاف أكثر من 600 نوع جديد محتمل في المتوسط سنوياً، ويقدر العلماء أن 91% من الكائنات البحرية لم يتم اكتشافها بعد.

ومع اكتشاف أي كائن حي جديد، يحاول العلماء تصنيفه، معتمدين على النظر في السمات الجسمانية/المادية للأفراد في المجموعة وتحديد ما إذا كانت مختلفة بدرجة كافية عن المجموعات الأخرى لتصنيفها كأنواع جديدة. ونظراً إلى وجود الكائنات الحية في المحيط ضمن بيئات مختلفة تماماً عن تلك الموجودة على الأرض، فإنها غالباً ما تتمتع بميزات غريبة، إذ تبدو الحيوانات مثل قناديل البحر وكأنها أكياس من الماء، وأن نجم البحر خمس أذرع. تتميز الأسماك الموجودة في المياه الضحلة للشعاب المرجانية بألوان زاهية، بينما تستخدم الأسماك الموجودة في أعماق البحار التالؤ البيولوجي (Bioluminescence) لجذب الفرائس. وبالتالي قد يكون

### مصطلحات علمية

#### المحيط : Ocean

كتلة متواصلة من مياه البحر على سطح الأرض، تتشكل حدودها بكتل اليابسة القارية أو تلال في قاع المحيط أو خط الاستواء.


#### البحار : Seas

مسطحات مائية أصغر وأقل عمّقاً من المحيطات، محاطة جزئياً باليابسة؛ وتكون حيث يتلقى المحيط باليابسة.

### أسئلة للمناقشة

١. ارتاد البشر القمر عدة مرات أكثر من ارتياههم أعمق الأجزاء من المحيطات. باعتقادك ما سبب ذلك؟ ناقش زملاءك.

٢. ناقش: لماذا يجب علينا المحافظة على الأنواع في المواطن البيئية المائية للأجيال القادمة؟ اقترح طرائق مختلفة يمكن من خلالها تحقيق ذلك.



الشكل ١-٤ التسلسل الهرمي التصنيفي للقرش الأزرق *Prionace glauca*

يعطى لكل كائن بحري اسمًا باللغة اللاتينية مكوناً من جزأين: الجنس، متبعاً بال النوع. يُسمى هذا النظام **التسمية الثنائية Binomial nomenclature**. وقد ابتكره عالم النبات السويدي كارولوس لينييوس Carolus Linnaeus

### مصطلحات علمية

#### التسلسل الهرمي التصنيفي : Taxonomic hierarchy

تصنيف نوع من أنواع الكائنات الحية عن طريق وصف النطاق، والمملكة، والشعبية، والطائفة، والرتبة، والعائلة، والجنس، والنوع.

#### التسمية الثنائية : Binomial nomenclature

الاسم латинский لكل نوع من الكائنات الحية، يتكون من جزأين: الجنس والنوع.

## ٤-١ تصنیف الكائنات الحية البحریة

تصنيف الكائنات الحية هو فرع مهم من علم الأحياء. يوجد على كوكب الأرض مليارات الأنواع، لكن منها سماتها المميزة وخصائصها وعلاقاتها، وفي هذه الوحدة سيتم التركيز على تصنیف الكائنات الحية البحریة، على الرغم من أن تقنيات تصنیفها يمكن تطبيقها على الأنواع التي تعيش على اليابسة وتلك التي تعيش في المياه العذبة على حد سواء.


إحدى الطرائق المستخدمة لفهم التنوع الحيوي الهائل الموجود في المحيطات هي استخدام **التسلسل الهرمي التصنيفي Taxonomic hierarchy**: إذ يتم في هذا النظام تصنیف الحياة المائية إلى مجموعات تصنیفية اعتماداً على السمات المميزة المشتركة بينها.

التسلسل الهرمي التصنيفي يُفرز كل نوع من الكائنات الحية ضمن سلسلة من مجموعات الكائنات المشابهة أو الأصنوفات Taxa. وتُجمّع الأنواع المشابهة في جنس Genus، والتي بدورها ترتبط معًا بعائلة Family، ثم رتبة Order، ثم طائفة Class، ثم شعبية Phylum، ثم مملكة Kingdom، ثم نطاق Domain. يوضح الشكل ١-٤ التسلسل الهرمي التصنيفي للقرش الأزرق، *Prionace glauca*.

بين سمات الكائن الحي، وبناء على الاختيار يتم التوجيه إلى مرحلة أخرى في المفتاح. يتم الاختيار بالسلسلة إلى أن يتم تحديد النوع. يمكنك استخدام الجدول ٤-٤، مع الشكل ٤-٢ الذي يُظهر السمات المميزة للقرش الأزرق، لتحديد القرش الأزرق من نوع القرش F.

لأول مرة في عام ١٧٣٦م، وفيه يُكتب الحرف الأول من الجنس كبيراً، ويُكتب الحرف الأول من النوع بحرف صغير، وعند طباعة الاسم الثنائي يُكتب بالخط المائل، على سبيل المثال الاسم الثنائي اللاتيني لبطريق غالاباجوس هو *Spheniscus mendiculus*، في حين عندما يُكتب يدوياً، يجب أن يوضع خط تحت كل الكلمة (على سبيل المثال *Spheniscus mendiculus*).

عندما يحاول علماء الأحياء البحرية تحديد النوع الذي تتنمي إليه عينة معينة، فإنهم غالباً ما يستخدمون **مفتاح التشعب الثنائي** *Dichotomous key*، الوارد في الجدول ٤-٤ حيث إنه يمثل سلسلة من الاختيارات



الشكل ٤-٢ رسم بيولوجي لقرش أزرق.



الصورة ٤-١ صورة فوتوغرافية لقرش أزرق  
. *Prionace glauca*

الاسم الشائع	السمة المميزة	الخطوة
	شكل الجسم يشبه الطائرة الورقية ... اذهب إلى الرقم ٢	١ أ
	<b>شكل الجسم لا يشبه الطائرة الورقية ... اذهب إلى الرقم ٣</b>	١ ب
نوع القرش A	زوايد على الخطم تشبه القرون	٢ أ
نوع القرش B	لا توجد زوايد تشبه القرون على الخطم	٢ ب
نوع القرش C	ستة شقوق خيشومية	٣ أ
	<b>خمسة شقوق خيشومية ... اذهب إلى الرقم ٤</b>	٣ ب
نوع القرش D	أشواك على الزعنفة الظهرية	٤ أ
	<b>لا توجد أشواك على الزعنفة الظهرية ... اذهب إلى الرقم ٥</b>	٤ ب
نوع القرش E	نهاية الخطم طويلة مدببة	٥ أ
	<b>نهاية الخطم ليست طويلة مدببة ... اذهب إلى الرقم ٦</b>	٥ ب
نوع القرش F	عينان كبيرتان محاطتان بحلقة صغيرة	٦ أ
	العينان في نهاية نتوء شبيه بالمطرقة	٦ ب

الجدول ٤-١ مفتاح تشعب ثانوي لتحديد نوع القرش.

## مهارة استقصاء: ملاحظات ورسوم الأحياء البحرية

### مقدمة

عند استقصاء الحياة في المحيط، من المهم أن يتمكن علماء الأحياء البحرية من وضع الرسوم البيولوجية إما للعينات الحية أو من الصور الفوتوغرافية لها. لا تتطلب هذه الرسوم أن تكون فناناً ماهراً؛ إذ إن الهدف منها ببساطة رسم تخطيطي واضح لسمات العينات وصفاتها البيولوجية الرئيسية.

### قبل أن تبدأ

١. اكتب مسمى العينة في أعلى الورقة البيضاء.
٢. ابدأ الرسم باستخدام قلم جرافيت حاد من نوع HB؛ للقيام برسم تخطيطي تقريبي للعينة. يجب أن يشغل الرسم نصف حجم المساحة المتاحة على الأقل، مع مراعاة ترك حيز على الجانبين لكتابة المسميات إذا لزم الأمر.
٣. تظليل الرسم العلمي غير مسموح، لذا يقتصر الرسم على خطوط متصلة واضحة لإظهار السمات. إذا تم ارتكاب خطأ في أثناء الرسم، يمكن استخدام ممحاة لإجراء التعديلات المطلوبة.
٤. حاول التأكد من أن مقاييس رسم الصورة مناسب (على سبيل المثال، أن تكون نسبة طول الذيل لطول السمكة الكلي صحيحة).
٥. عليك التدقيق جيداً في العينة إذا رغبت أن يكون الرسم دقيقاً علمياً. مثال: عليك أن تدقق في ما إذا كان للسمكة شوكتان ظهريتان أو ثلاث شوكتات.
٦. حاول أيضاً التأكد من أن موضع السمات الظاهرة وحجمها صحيح بيولوجيًّا (على سبيل المثال، أين تبدأ الزعانف الظهرية مقارنة بالزعانف الشرجية؟).
٧. استخدام المسميات طريقة جيدة لتسمية ووصف الخصائص والسمات التي تم ملاحظتها في العينة. يجب أن تكون المسميات مكتوبة بوضوح، على أن يكون موضعها على جوانب الرسم، وأن تكون الخطوط المشيرة إلى المسمى أفقية ومرسومة بقلم جرافيت بالمسطرة، كما يجب التأكد من أنها تلامس الجزء المحدد.
٨. أضف المسميات التالية إلى رسمك: الغطاء الخيشومي، الخط الجانبي، الزعنفة الصدرية، الزعنفة الذيلية، الزعنفة الشرجية، الزعنفة الحوضية، الزعنفة الظهرية، أشواك الظهر، العين، الفم.

### مصطلحات علمية

**\*الرسم البيولوجي** *Biological drawing*  
رسم علمي يسجل صورة عينة وأبرز سماتها.

### المواد والأدوات

قبل أن تبدأ تأكّد من وجود المواد والأدوات التي ستحتاج إليها:

- قلم جرافيت HB حاد وصلب.
- ممحاة، مبراة، مسطرة.
- ورق أبيض.

### الطريقة

استخدم صورة السمكة شائكة الظهر Stickleback fish الطاهرة في الصورة ٤-٢ لتنفيذ رسم بيولوجي.



الصورة ٤-٢ صورة فوتوغرافية لسمكة شائكة الظهر.

تابع

بقلم جرافيت مع المسئيات وخطوط مسئيات مستقيمة تُسيطر بالمسطرة، يجب عدم تنفيذ رسوم تقريرية وعدم استخدام النظليل.

### التقييم والاستنتاجات

١. اشرح: ما الذي يجعل الرسم البيولوجي جيداً؟
٢. اقترح سبب اختلاف الرسوم البيولوجية عن التمثيل الفني للكائن الحي.
٣. بعد إنتهاء الرسم، شارك زميلاً آخر لك في الصنف وأطلع على رسمه. قارن بين الرسمين. هل يمكنك تحسين أيّاً منهما؟

٩. إذا طلب إليك «إضافة مسئيات» فإن اسم السمة الملاحظة هو المطلوب. في الرسوم المشروحة يجب أن يتضمن المسمى أيضاً توضيحاً لكيفية ملائمة كائن حي للعيش في نظام بيئي بحري، فعلى سبيل المثال: يكتب «غطاء خيشومي ضروري للتهوية، إذ إنه غطاء عظمي يغطي الخياشيم ويحميها». يمكنك أيضاً إضافة شروح لوصف لون السمة أو أية ملاحظات سلوكية لاحظتها.

### النتائج

يجب أن تكون نتائج هذه التجربة على شكل رسم تخطيطي مع المسئيات، على أن يكون الرسم كبيراً وواضحاً ومرسوماً

### أسئلة


- ١) انقل الجدول ٢-٤ وأكمله لوصف التسلسل الهرمي التصنيفي لبطريق غالاباجوس *Spheniscus mendiculus*.

التصنيفي	التسلسل الهرمي
بطريق غالاباجوس	بطريق غالاباجوس
حقيقية النواة	Eukarya
الحيوانات	Animalia
الحجليات	Chordata
الطيور	Aves
بطريقيات الشكل	Sphenisciformes
البطريقيات	Spheniscidae

الجدول ٢-٤ التسلسل الهرمي التصنيفي لبطريق غالاباجوس.

- ٢) أ. الشكل ٣-٤ هو رسم بيولوجي لجراد البحر. اذكر ثلاثة سمات جيدة في الرسم وثلاث سمات يمكن تحسينها.

- ب. ارسم رسمًا بيولوجيًّا لبوليب المرجان من الصورة ٣-٤. أضف المسئيات لتحديد موقع التراكيب الآتية: الفم، لامس، خلية لاسعة.



الشكل ٣-٤ رسم بيولوجي لجراد البحر.



الصورة ٣-٤ بوليب مرجان.

**الأنواع الرئيسية Keystone species** مؤشرًا على صحة النظام البيئي فقط بل على تأثير الإنسان على البيئة البحرية أيضًا.

### مصطلحات علمية

#### العوالق Plankton:

كائنات بحرية مجهرية تطفو بحرية.

#### العوالق الحيوانية Zooplankton:

عوالق مستهلكة، وهي حيوانات إما أن تطفو أو تسبح ببطء.

#### شوكيات الجلد Echinoderms:

مجموعة من اللاذقاريات البحرية أجسامها ذات تماثل خماسي ولها أقدام أنبوبية.

#### القشريات Crustaceans:

مجموعة من اللاذقاريات البحرية مع هيكل خارجي صلب، وعشرون أرجل مفصليّة ومرحلة يرقة نوبليوس (يرقة صغيرة جدًا وشفافة).

#### الأسماء العظمية Bony fish:

الأسماء التي لها هيكل عظمي وهي تمثل طائفة الأسماء العظمية Osteichthyes.

#### الأسماء الغضروفية Cartilaginous fish:

الأسماء التي لديها فكوك وهيأكل من الفضارييف وهي تمثل طائفة الأسماء الغضروفية Chondrichthyes.

#### الطحالب الكبيرة Macroalgae:

منتجات بحرية، منها طحلب الكلب وعشب البحر.

#### النباتات البحرية Marine plants:

نباتات مائية زهرية توجد غالباً في مصبّات الأنهار والبيئات الساحلية.

#### \*النوع الرئيسي Keystone species:

كائن له دور فريد وأساسي في طريقة عمل النظام البيئي؛ بدون أنواع الرئيسية، سيكون النظام البيئي مختلفاً على نحو كبير، أو قد يختفي من الوجود تماماً.

## ٤- المجموعات الرئيسية للكائنات الحية البحرية

هناك تنوع هائل في الكائنات الحية البحرية: إذ يتراوح حجمها من البكتيريا والعوالق Plankton المجهرية، وصولاً إلى أكبر حيوان على وجه الأرض، الحوت الأزرق، الذي يمكن أن تصل كتلته إلى 180 000 kg وطوله إلى ما يزيد على 30 m والذي يوجد منه في سلطنة عمان في بحر العرب وببحر عمان. المنتجات البحرية بما في ذلك، العوالق النباتية والطحالب الكبيرة والنباتات البحرية ضرورية للإنتاجية الأولية للبيئة البحرية وهي تدعم كائنات حية أخرى كثيرة.

في هذا الموضوع، سنستكشف عينة من الحياة المائية وذلك بمقارنة خصائص ثمانى مجموعات من الكائنات البحرية:

• العوالق النباتية Phytoplankton

• العوالق الحيوانية Zooplankton

• شوكيات الجلد Echinoderms

• القشريات Crustaceans

• الأسماء العظمية Bony fish

• الأسماء الغضروفية Cartilaginous fish

• الطحالب الكبيرة Macroalgae

• النباتات البحرية Marine plants

وسنستكشف أيضاً الأهمية البيئية والاقتصادية لكل مجموعة. سنستخدم مجموعة من الأمثلة المحددة على الكائنات التي تؤدي أدواراً أساسية في مواطنها البيئية المائية: نجم البحر المكلل بالأشواك (COTS)، والأنشوجة البيروفية Peruvian anchoveta، وطحلب الكلب، والحسائش البحرية. لا تُعدّ وفرة وتوزيع هذه

## دراسة حالة ١-٤


القاتللة إلى زيادة افتراس ثعالب البحر. وبالمثل، فإن انخفاض أعداد الفقمات وأسود البحر قد يتسبب بتغيير الحيتان القاتلة لنظامها الغذائي وذلك بتضمينه مزيداً من ثعالب البحر.

وتواجه أعداد الجماعات الأحية لثعالب البحر عدداً من تهديدات الإنسان؛ إذ غالباً ما تُحتجز ثعالب البحر في الشباك والفخاخ المتروكة، الأمر الذي يسبب إصابتها أو موتها. ويؤثر تلوث المحيطات بالنفط المتسرّب إلى انسداد فراء ثعلب البحر؛ فيقلل من قدرة الفراء على حماية الحيوان من المياه الباردة، وبالتالي يؤدي إلى الوفاة نتيجة انخفاض درجة حرارة جسمه. وتسهم أيضاً المياه الملوثة في انتشار الأمراض بين بعض الجماعات الأحية لثعلب البحر، إضافة إلى الصيد للحصول على الفراء الذي كان له، تاريخياً، تأثير كبير على أعداد ثعلب البحر؛ فقد قام تجار الفراء الأوروبيون والأمريكيون الشماليون بصيد ثعالب البحر إلى أن اقتربت من الانقراض في القرن التاسع عشر. ويؤدي صيد الأسماك التجاري إلى تقليل أعدادها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الغذاء المتاح لثعالب البحر.

## أسئلة

١. لماذا تتمو غابات طحلب الكلب في المياه الضحلة فقط؟
٢. اشرح كيف يمكن أن يؤثر انخفاض كثافة طحلب الكلب على وفرة الأسماك.

٣. باستخدام الشبكة الغذائية لغابة طحلب الكلب الظاهرة في الشكل ٤-٤، اقترح أسباباً لتأثيرات إيجابية وسلبية محتملة قد يسببها انخفاض كثافة طحلب الكلب على صناعة صدف محار أذن البحر المحلية؟



الشكل ٤-٤ شبكة غذائية لغابة طحلب الكلب.

## أهمية ثعالب البحر في المحافظة على النظم البيئية لغابات طحلب الكلب

طحلب الكلب نوع من الطحالب كبيرة الحجم تقوم بعملية التمثيل الضوئي. وبما أن طحلب الكلب يعُد من المنتجات، فهو ضروري للعديد من الكائنات الأخرى التي تعيش في غاباته. وقد يتضرر طحلب الكلب من قنافذ البحر، كونها من شوكيات الجلد التي تعمل على فصل طحلب الكلب عن المثبت الذي يثبتها بالركيزة الصخرية. تشمل العوامل الحيوية التي تحكم في الجماعات الأحية لقنافذ البحر مفترسات مثل ثعالب البحر *Enhydra lutris*. تُظهر الشبكة الغذائية لغابة طحلب الكلب (الشكل ٤-٤) أن الحياة في المحيط أكثر تعقيداً من مجرد سلسلة غذائية بسيطة مثل:

طحلب الكلب ← قنافذ البحر ← ثعلب البحر


في الواقع، يتغذى على طحلب الكلب عدة أنواع، بما في ذلك حيوان من الرخويات يُسمى أذن البحر (صفيلح)، والسرطانات، والأسماك آكلة الأعشاب. ويوجد أيضاً مجموعة من المفترسات الإضافية التي تتغذى على قنافذ البحر والتي تشمل نجم البحر والأسماك العظمية الكبيرة (مثل سمك القد وأسماك الخراف).

إن العلاقات بين المفترس والفرسنة مهمة للمحافظة على توازن صحي للجماعات الأحية داخل النظام البيئي لغابة طحلب الكلب. فمثلاً تتغذى ثعالب البحر على قنافذ البحر، وعندما تخضع أعداد ثعالب البحر فإن كثافة غابات طحلب الكلب تخضع أيضاً بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد قنافذ البحر. وإذا لم تحم هذه المفترسات غابات طحلب الكلب من ضرر قنافذ البحر، فستتشكل في النهاية مناطق فقيرة بـطحلب الكلب أو مناطق قاحلة لا يوجد فيها طحلب الكلب. وبالتالي سيؤدي انخفاض الإنتاجية في هذا النظام البيئي إلى تقليل الطاقة الكيميائية (الغذاء) لأنواع أخرى في الشبكة الغذائية، الأمر الذي يتسبب بانخفاض التنوع البيولوجي.

تعد ثعالب البحر نوعاً أساسياً لغابات عشب البحر؛ لأن العديد من الجماعات الأحية الأخرى تعتمد عليها. ويؤدي فقدان ثعالب البحر إلى انخفاض كبير في التنوع البيولوجي بشكل عام.

تسبب العوامل غير الحيوية بما في ذلك التغيرات المناخية (مثل العواصف، وتذبذب النيبيو الجنوبي، والاحتباس الحراري) انخفاض أعداد ثعالب البحر. إضافة إلى ذلك فإن العوامل الحيوية الطبيعية يمكنها أيضاً أن تؤثر سلباً على وفرة ثعالب البحر. وتؤدي الزيادة في أعداد الحيتان

## الأنواع الرئيسية العوالق



الصورة ٤-٤ العوالق النباتية: (أ) الدياتومات؛  
(ب) السوطيات الدوّارة.

السوطيات الدوّارة Dinoflagellates (الصورة ٤-٤ ب) هي أيضًا أوليات أحادية الخلية، إلا أنها لا تمتلك جداراً خلويًا مكونًا من السيليكا كما في الدياتومات. تعيش السوطيات الدوّارة في المياه السطحية العلوية للمحيطات شأنها شأن الدياتومات، ويمكنها أن تتكاثر بشكل سريع لينجم عنها ازدهار الطحالب عندما تكون الظروف ملائمة. يُنتَج الازدهار لبعض أنواع السوطيات الدوّارة

العوالق Plankton كائنات مجهرية حركتها محدودة، فهي تطفو ببساطة مع التيار في الماء (أصل كلمة يوناني، وهي تعني «التجوال»). تقسم العوالق إلى مجموعتين: العوالق النباتية والعوالق الحيوانية. العوالق النباتية منتجات تحصل على غذائها باستخدام الطاقة الضوئية عن طريق عملية التمثيل الضوئي، لذلك فهي مهمة في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتشكل قاعدة لعدة شبكات غذائية بحرية. أما العوالق الحيوانية فهي مستهلكات تحصل على غذائها من الطاقة الغذائية في المنتجات والمستهلكات التي تتغذى عليها.

### العوالق النباتية

هناك العديد من الأنواع المختلفة من العوالق النباتية Phytoplankton. فمعظم العوالق النباتية التي تعيش في المحيطات المفتوحة تطفو بحرية في المياه السطحية حيث تكون شدة الإضاءة في أعلى مستوياتها، ولا تحتاج إلى الاستقرار على ركيزة ما، وإنما تحملها تيارات المحيط حيثما تتحرّك.

الدياتومات Diatoms عوالق نباتية أحادية الخلية توجد في المياه السطحية المحيطية (الصورة ٤-٤ أ). هناك أكثر من مئة جنس مختلف منها، إلا أن لجميعها جدرانًا خلوية معقدة من السيليكا Silica، والتي تكون غالباً بتصاميم جميلة وفريدة. وللدياتومات مقدرة على التكاثر بسرعة كبيرة في الظروف المثالية، وغالباً ما يُشاهد ازدهارها في الربيع. يحدث هذا عندما ترتفع شدة الإضاءة ودرجة الحرارة، وتُدفع أيونات الأملاح المعدنية إلى السطح عن طريق التيارات الصاعدة للمياه. يميل ازدهار الدياتومات للظهور لفترة وجيزة إلا أنها تختفي بسرعة بسبب استهلاكها من قبل المستهلكات الأولية التي من أمثلتها الكريل والقشريات العوالقية (مثل مجدافيات الأرجل)، ونضوب أيونات الأملاح المعدنية.

قناديل البحر Jellyfish. تهاجر العوالق الحيوانية عمودياً في الماء كل يوم؛ لتتغذى على العوالق النباتية الموجودة في الطبقة الضوئية. وتتوفر هذه العوالق رابطاً مهماً في السلسلة الغذائية بين المنتجات والمستهلكات الأكبر حجماً بما فيها المحار والأسمك والحيتان. العوالق الحيوانية حساسة للتغيرات البيئية وقد تموت بسبب التلوث الناتج من الميكروبلاستيك، وتحمّض المحيطات أو ارتفاع درجة حرارتها بفعل الاحتباس الحراري.

بعض الكائنات البحرية عدّة دورات حياة معقدة يتطرّف فيها البيض إلى **يرقات Larvae** قبل أن تتحول إلى يافعات Juveniles ثم إلى أفراد بالغة. تشمل اليرقات المرحلة العوالقية Planktonic stage تقريرياً لكل أنواع الأسماك واللافقاريات مثل نجم البحر (الصورة ٤-٥). تتأقلم اليرقات لتعيش عائمة في المحيط.

مجدافيات الأرجل (الصورة ٤-٥ ب) هي قشريات تضم المجموعة الأكثر وفرة وتتوّعاً من العوالق الحيوانية. وهي آكلات أعشاب صغيرة تتغذى على الدياتومات.

### مصطلحات علمية

#### \***اليرقات** *Larvae*

مرحلة عوالقية من التطور تحدث بين مرحلتي البيضة واليافعة؛ توجد تقريرياً في جميع أنواع الأسماك واللافقاريات.

سموماً قد تسمم الأسماك وتتراكم في المحاريات. وقد تسبّب المحاريات الملوثة تسمم الإنسان والكائنات الحية الأخرى التي تتغذى عليها. ويُسمى ازدهار السوطيات الدوّارة التي تُنتج سموماً ازدهار الطحالب الضارة (Harmful algal blooms HABs) وتشمل المد الأحمر، الذي يسبّب ظهور مناطق من المحيط باللون الأحمر. وقد أجريت في سلطنة عمان العديد من الدراسات حول ظاهرة المد الأحمر، ومنها دراسة 2024، حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة المد الأحمر على مجتمع الصيادين في ولاية برقاء. والتلوث الناجم عن جريان الأسمدة من الحقول يسبّب ازدهار العديد من السوطيات الدوّارة، ومع ازدياد كثافة الزراعة واستخدام الأسمدة، ازدادت أعداد الطحالب الضارة (ستتم مناقشة التأثيرات البشرية على المياه البحرية في الصف الثاني عشر). تظهر بعض أنواع السوطيات الدوّارة سمة الإضاءة الحيوية Bioluminescence، والتي يمكن رؤيتها غالباً في الليل على المحيط أو على الساحل مشكلة عروضاً مذهلة في المساء. وتعمل هذه السمة كآلية دفاع، حيث تميل إلى جذب المفترسات الكبيرة إلى المنطقة، والتي بدورها تستهلك مفترسات السوطيات الدوّارة.

### العوالق الحيوانية

العوالق الحيوانية Zooplankton مستهلكات مهمة وتشمل اليرقات، ومجدافيات الأرجل، والحيوانات الكبيرة، ومنها



(ج)




(ب)



(أ)

الصورة ٤-٥ العوالق الحيوانية: (أ) يرقات نجم البحر (ب) مجذافية الأرجل (ج) قنديل البحر.

من المواطن البيئية لقاع البحر من المنطقة المتشكّلة بين المد والجزر Intertidal zone وصولاً إلى الأعمق. (شوكيات الجلد) مسمى أصله يوناني، نسبة إلى جلدها الشوكي المميز الذي يتكون من طبقة رقيقة من الجلد تغطي هيكلًا عظيمًا من كربونات الكالسيوم (انظر الشكل ٦-٤). لشوكيات الجلد يرقات عوالقية تتطور إلى أفراد بالغة تتصف **بالمتماثل الخماسي Pentaradial symmetry**: أي لها خمس أذرع تتفرع من تجويف مركزي لجسم يحتوي على فم وفتحة شرج. تتحرك شوكيات الجلد عن طريق نظام من الأنابيب الممتدة بالماء التي تزيد وتقلل من الضغط الهيدروليكي في



الشكل ٦-٤ السمات الرئيسية لفردبالغ من شوكيات الجلد.

#### مصطلحات علمية

**المتماثل الخماسي Pentaradial symmetry**: خمس أذرع تتفرع من تجويف مركزي للجسم.

تعيش أنواع قناديل البحر (الصورة ٥-٤ ج) في جميع أجزاء المحيط وتنتمي إلى الشعبة نفسها (اللافسات)، كما الشعاب المرجانية وشقائق النعمان البحرية. يتكون الكثير من هذه الكائنات اللينة والهشة من جزأين أحدهما جرس شفاف يسمى الميدوزا Medusa تتدلى منه لوامس، وقد يصل امتداد الميدوزا إلى ١ m مع اللوامس التي تمتد إلى ٦٥ m. تبقى قناديل البحر عوالق طوال حياتها، وتنمحها نبضات الميدوزا لاذعة محدودة. إن قناديل البحر مفترسات لها خلايا لاذعة تُسمى الخلايا اللاسعية تكون على لوامسها لقتل العوالق الأخرى ويرقات الأسماك.

ومن الأمثلة الأخرى على العوالق الحيوانية الكريل، وهو مفترس يُشبه الروبيان. فهو من القشريات آكلات اللحوم ويتجذب على أنواع أخرى من العوالق الحيوانية والعوالق النباتية. يُعد الكريل مصدر غذاء مهمًا للطيور والأسماك والفقامات والحيتان البالينية (وقد تعرّف العلماء على خمسة عشر نوعًا من حيتان البالين عديمة الأسنان في سلطنة عمان).

## شوكيات الجلد

شوكيات الجلد Echinoderms هي شعبة من اللافقاريات البحرية وتشمل نجوم البحر Seastars، وقناديل البحر Sea urchins، وخيار البحر Sea cucumbers، وزنابق البحر Sea lilies ونجوم البحر الهشة Brittle stars (انظر الشكل ٥-٤). هناك أكثر من 7000 نوع من شوكيات الجلد، والتي يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة



الشكل ٥-٤ الطوائف الخمس الرئيسية لشوكيات الجلد.

البيئية ويلحق انخفاضاً في التنوع البيولوجي وانخفاضاً في تنوع الأنواع (ستدرس هذا الموضوع بتوسيع أكثر في الصف الثاني عشر في «دراسة حالة»).

### غابات طحلب الكلب

فيما يأتي سلسلة غذائية أساسية في غابات طحلب الكلب : Kelp

طحلب الكلب ← قنافذ البحر ← ثعالب البحر

عندما يفرط الإنسان في اصطياد قنافذ البحر، قد يكتسح طحلب الكلب النظم البيئية. وبشكل مماثل، عند اصطياد ثعالب البحر إلى حد انقراضها طمعاً في الحصول على فرائصها ستتلاشى قنافذ البحر، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير غابات طحلب الكلب Kelp barrens وهذا يمثل العلاقة غير المتوازنة بين المفترس والفريسة، الأمر الذي يسبب اختلالاً في النظام البيئي (انظر دراسة الحالات ٤-١).

### الشواطئ الرملية

يقوم خيار البحر بتقديمة مياه البحر على الشواطئ الرملية، وتشكيل جحور في الرمال، مما يزيد من مستويات الأكسجين التي تتوافر للكائنات الحية الأخرى (الصورة ٤-٧). ويمثل خيار البحر ويرقاته العوالقية جزءاً مهماً من السلسلة الغذائية للأسماك التي تتغذى عليها. وهو يبتلع مع طعامه الرمال، وبالتالي يساهم في تقليل تربة القاع، وإعادة تدوير المغذيات بها، وتمثل فضلاته النيتروجينية مغذيات مهمة للمواطنين البيئيين البحريين.



الصورة ٤-٧ خيار البحر.

**الأقدام الأنبوية** Tube feet المترتبة في تجاويف على الجانب السفلي لكل ذراع. يستخدم نجم البحر الأقدام الأنبوية لفتح أصداف الرخويات ذات الصدفتين، ومنها المحار والبطلنوس Clams (الصورة ٤-٦).



الصورة ٤-٦ الأقدام الأنبوية لفرد من شوكيات الجلد.

### مصطلحات علمية

**الأقدام الأنبوية** Tube feet نتوءات أنبوية تساعد في الحركة والتغذية والتنفس.

### الأهمية البيئية لشوكيات الجلد

تعيش شوكيات الجلد في العديد من المواطن البيئية، ويمثل بعضها أنواعاً رئيسية.

### الشعاب المرجانية

نجم البحر المكلل بالأشواك (COTS) (Acanthaster planci) نوع رئيسي في المجتمعات الأحيائية للشعاب المرجانية Coral reefs. وهو يتغذى على أنواع المرجان الأسرع نمواً، وهذا يساعد على نمو أنواع المرجان بطئ النمو، فيزيادة التنوع البيولوجي للمرجان، وبالتالي يزداد التنوع البيولوجي الشامل للشعاب المرجانية. ومع ذلك، قد تؤدي إزالة مفترسات (COTS) إلى زيادة كبيرة في أعداده، فينجم عنها تدمير سريع لمساحات واسعة من الشعاب المرجانية، الذي يتسبب بتدمير الكثير من المواطن

## القشريات

تأقلمت القشريات Crustaceans المائية للعيش في المياه المالحة، وفي المياه قليلة الملوحة أو العذبة، ويمكن العثور عليها في جميع المواطن البيئية المائية تقريباً. وتشمل القشريات سرطان البحر، وجراد البحر، والكركند، والكرييل (الصورة ٤-٨)، والروبيان (الشكل ٧-٤)، والبرنقيل، ومجدافيات الأرجل، ومزدوجات الأرجل، وقمل السمك. تتميز القشريات بمرحلة يرقة عوائقية مميزة تسمى **نوبيوس Nauplius**.



الصورة ٤-٨ كريل القطب الجنوبي.

### مصطلحات علمية

**\*نوبيوس Nauplius**


مرحلة يرقة مميزة في القشريات.

## الأهمية الاقتصادية لشوكيات الجلد

يُعد خيار البحر وقاذف البحر طعاماً شهياً في العديد من ثقافات البلدان المختلفة، لكن الإفراط في حصادها قد يسبب انخفاض جماعتها الأحيائية وأزمات اقتصادية حيث تعتمد العديد من الصناعات المحلية عليهم. ويمثل مخزون خيار البحر العماني جزءاً مهماً من مخزون الأسماك في السلطنة، لذا تبذل جهود كبيرة لحفظه عليه وتنميته بشكل مستدام عن طريق إقامة مشاريع لزراعته في البيئة البحرية. سوف تستفيد مجتمعات الصيد الأحيائية المحلية من التخطيط طويل الأمد للزراعة المائية لحفظه على الجماعات الأحيائية. وسيدعم ذلك الصناعات ذات الصلة، على سبيل المثال، الصناعات التجميلية والغذائية والطبية من خلال استخدام خيار البحر لصناعة الأدوية التي تبطئ نمو بعض أنواع سرطان البحر.

ويمكن في مجال الزراعة إضافة الهياكل الخارجية لقاذف البحر الغنية بكربيونات الكالسيوم إلى الأسمدة لمعادلة حامضية التربة. كما تمثل قاذف البحر كائنات حية نموذجية (كائنات حية تمتلك سمات وخصائص مشتركة هي الأكثر شيوعاً) في أبحاث التطور في علم الأحياء.

ومع ذلك، قد يتسبب نجم البحر بضرر لصناعة السياحة البيئية عندما يدمر أحواض طحلب الكلب أو الشعاب المرجانية التي ترتادها شركات الغوص.



الشكل ٤-٧ رسم بيولوجي لروبيان. لا تحتاج إلى معرفة أسماء أشكال الأطراف المتخصصة (المميزة بعلامة \*). ولكنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام الأرجل المفصلية بطريق مختلفة.

للروبيان أهمية بيئية واقتصادية، إذ يُعد من الثروات المهمة في سلطنة عمان لما يتميز به من قيمة غذائية، وزيادة الطلب عليه في الأسواق المحلية والعالمية. تُعد «محمية الأراضي الرطبة» في ولاية محوت غنية بالقشريات، لذلك هي أحد المواطن البيئية لتغذية أكثر من (20) نوعاً من الحيتان والدلافين التي تم رصدها في المنطقة.

## الأسماك العظمية

96% من الأسماك لديها هيكل عظمي وتنتمي إلى طائفة الأسماك العظمية *Osteichthyes* ويمكن التعرف عليها عن طريق سماتها الخارجية (الشكل ٤-٤) :

- الخياشيم Gills:** تراكيب غشائية وردية رقيقة توفر مساحة سطح كبيرة لتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين مياه البحر ودم الأسماك، تكون مدعاة بتراتيب عظمية تُسمى أقواس خيشومية Gill arches.

### مصطلحات علمية

**الدرع Carapace :**

جزء من الهيكل الخارجي للقشريات يحمي الجانب الظاهري للرأس صدري.

**الخياشيم Gills :**


سطح تبادل الغازات في الأسماك.

أصل اسم القشريات Crustaceans لاتيني والذي يعني «القشرة الصلبة Hard shell». فهي تمتلك هيكلًا خارجياً صلباً يتكون من الكالسيوم وسكر متعدد يُسمى كايتين Chitin، وهو بدوره يوفر الحماية من الحيوانات المفترسة ومن فقدان الماء، في حين يوفر الجزء الداخلي الدعم لتنبيط العضلات. يُقسم الجسم إلى رأس صدري وبطن مجزأ إلى عدة قطع.

الرأس الصدري Cephalothorax هو رأس وصدر متّحدان معًا، (إذ إن القشريات ليس لها عنق) ويحوي القلب والخياشيم والمعدة، ويفطي الجانب الظاهري ويحميه غطاء صلب يُسمى الدرع Carapace. للقشريات زوجان من قرون الاستشعار: زوج منها قصير، ولها عيون مركبة وفكوك مكونة من أزواج.

للقشريات على الأقل خمسة أزواج من الأرجل المفصليّة، ومن السمات المميزة الأخرى التي تميزها عن مفصليات الأرجل الأخرى، أن للأرجل أطرافاً مكونة من جزأين. ويحتوي الرأس الصدري على أرجل كلابية (مخالب) وأرجل مشي يمكن استخدامها أيضاً لجمع الطعام.

ويحتوي البطن المجزأ على أرجل سباحة قد تساعده أيضاً في التكاثر، وينتهي البطن بذيل على شكل مروحة (الشكل ٤-٧).



الشكل ٤-٨ رسم بيولوجي (أ) السمات والأجزاء الخارجية للأسماك العظمية، (ب) السمات والأجزاء الداخلية للأسماك العظمية.

والتوقف، والسباحة. تأقلمت الزعانف الصدرية في سمكة اليد الحمراء للمشي (الصورة ٤-٩)، في حين تستخدم السمكة الطائرة زعنافها الصدرية للقفز فوق الأمواج (الصورة ٤-٩ ب).

- **الزعنة الذيلية Caudal fin:** توجد عند ذيل السمكة وهي المصدر الرئيسي لقوة الدفع. وتتنوع أشكال الزعانف الذيلية اعتماداً على أسلوب سباحة السمكة، وتساهم في تحديد نوع الحركة التي تقوم بها.
- **الزعانف الحوضية Pelvic fins:** توجد في أزواج، واحدة على كل جانب من جسم السمكة. وتساعد على الاستقرار وفي بعض الأسماك تتأقلم للمشي على ركيزة القاع أو الالتصاق بها.

### مصطلحات علمية

#### الغطاء الخيشومي Operculum :

سديلة عظمية رقيقة من الجلد تغطي الخياشيم وتحميها.

#### الخط الجانبي Lateral line :

قناة على الرأس وجانب السمكة تحتوي على أعضاء حسية؛ يكون مرئياً في الأسماك العظمية، إلا أنه يكون تحت الجلد في الأسماك الغضروفية.

#### الحراشف Scales :

صفائح رقيقة متراكبة من العظام مغطاة بالجلد والمخاط توجد على الجزء الخارجي من السمكة.

#### الزعانف Fins :

تبرز من سطح الجسم وتساعد في الحركة، والتوازن، والتكاثر، والحماية.



(ج)



(ب)



(أ)

الصورة ٤-٩ تأقلم الأسماك العظمية: (أ) سمكة اليد الحمراء، (ب) السمكة الطائرة، (ج) سمكة الضفدع المشعرة.

• **الغطاء الخيشومي Operculum:** سديلة عظمية رقيقة تغطي الخياشيم وتحميها. عندما يفتح الغطاء الخيشومي ويغلق يسمح لماء البحر الذي يحتوي غازات ذاتية بأن يتدفق إلى الخياشيم، الأمر الذي يمكنها من التهوية وتبادل الغازات.

• **الخط الجانبي Lateral line:** قناة يمكن رؤيتها على الرأس وجانب الجسم في الأسماك العظمية. تحتوي على أعضاء حسية يمكنها تحسّن التغيرات في المجال الكهربائي (مستقبلات كهربائية) وكذلك الاهتزازات في الماء (مستقبلات ميكانيكية)، الأمر الذي يساعد في سلوك التجمع، والتنقل واكتشاف الفرائس.

• **الحراشف Scales:** مكونة من العظام، ومغطاة بالجلد والمخاط. تساعد الحراشف في حماية السمكة وتزيد من كفاءتها الهيدروديناميكية (أي تقليل المقاومة والاحتكاك مع الماء، الأمر الذي يزيد من سرعة السمكة وقدرتها على المناورة بسهولة).

• **الزعانف Fins:** تبرز من سطح الجسم وتساعد في الحركة، وحفظ التوازن، والتكاثر والحماية. توجد خمسة أنواع رئيسية للزعانف في الأسماك العظمية، هي:

◦ **الزعانف الصدرية Pectoral fins:** تكون على شكل أزواج على جانبي الجسم، خلف الغطاء الخيشومي. تساعد هذه الزعانف في الاستدارة، والتوازن،

البيئية المائية والبرية عندما تصطادها الحيوانات البرية أو عندما تجرف إلى الشاطئ.

ومن الأمثلة على الأهمية البيئية للأسماك العظمية أنواع سمك السلمون التي تهاجر من البحر إلى أعلى النهر لتضع بيضها وتموت. خلال هذه الهجرة، تتغذى الدببة على السلمون وبقаяه (الصورة ٤-١٠). تساعد حيًّف السلمون النافق والبيض المتبقى في المجرى المائي على توفير المغذيات الضرورية في نهاية الصيف والتي تضمن بقاء العديد من الأنواع المائية في الشتاء. ولهذا السبب تُعدُّ وفرة السلمون، كنوع أساسي، مؤشراً على جودة المياه وصحة النظام البيئي في الأراضي الرطبة بأكمله.



الصورة ٤-١٠ دب سنجاري اللون يصطاد سلمون الساكي (الأحمر).

تتوافر في سواحل سلطنة عمان عدة أنواع من أسماك الأنشوجة (القاشع)، ومنها أنشوجة دفيس، وأنشوجة الرأس القصير، وأنشوجة القرصان. ومن أنواعها المعروفة عالمياً الأنشوجة البيروفية. هذه الأسماك تفترسها المفترسات لتتغذى عليها، وهي جزء مهم بيئياً في السلسلة الغذائية البحرية، إذ توفر الغذاء لـ:

- الأسماك الأكبر حجماً مثل أسماك التونة والسلمون.
- الثدييات البحرية مثل الدلافين والحيتان.
- الطيور البحرية مثل النوارس والبجع.

وإذا تم صيد الأسماك العظمية بمستويات أعلى من المستويات المستدامة، فسيؤدي ذلك إلى انهيار مخزون

هـ الزعنفة الشرجية Anal fin: توجد على السطح البطني خلف فتحة الشرج Anus. تساعد أيضاً على استقرار السمكة في أثناء السباحة.

هـ الزعانف الظهرية Dorsal fins: توجد على سطح ظهر السمكة، وقد يكون عددها ثلاثة، تساعد في التوجيه والتوازن، وحماية السمكة من الانقلاب، وتمكنها من التوقف والانعطاف المفاجئ. قد يكون لهذه الزعانف أشواك توفر الحماية من المفترسات. تستخدم سمكة الضفدع المشعرة Hairy frogfish شوكة على زعنفتها الظهرية كطعم لجذب الفريسة (الصورة ٩-٤ ج).

تحتوي الأسماك العظمية أيضاً على مجموعة متنوعة من السمات الداخلية التي يمكن رؤيتها فقط عند تشريح السمكة. فهي تحتوي على فك وهيكل عظمي مكون من العظام والغضاريف (الشكل ٨-٤ ب). تحتوي العديد من الأسماك العظمية أيضاً على **مثانة العوم** Swim bladder، وهي عضو متخصص يساعد على الطفو، وذلك عن طريق إضافة أو إطلاق الغاز بين مثانة العوم والدم. تتمكن مثانة العوم الأسماك العظمية من البقاء في المياه عائمةً من دون الحاجة إلى السباحة المستمرة.

### مصطلحات علمية

**مثانة العوم**: Swim bladder  
عضو طفو موجود في الأسماك العظمية.

### الأهمية البيئية للأسماك العظمية

عندما تهاجر الأسماك العظمية وتتغذى وتتكاثر فإنها تؤدي دوراً بيئياً أساسياً، وذلك بربط دورات المغذيات في المواطن البيئية المختلفة التي تعيش فيها. ومن خلال الإخراج، تطلق النترات والفوسفات وغيرها من الأيونات المغذية بشكل يمكن امتصاصه بسهولة من قبل المنتجات. وتؤدي الأسماك العظمية أيضاً دوراً مهماً في الشبكات الغذائية، فإلى جانب دورها كمصدر غذاء وغير للعديد من الأنواع البحرية فهي تربط بين النظم

- تشمل الفوائد الاقتصادية الأخرى:
- ممارسة رياضة صيد الأسماك الترفيهية في المياه المالحة.
  - رياضة الغوص، والغوص بجهاز التنفس للسياح البيئيين.
  - صيد وتربيه الأسماك الاستوائية كحيوانات أليفة.
  - استخدام الأسماك للتعليم والبحث العلمي.

## الأسماك الغضروفية

تُعد طائفة الأسماك الغضروفية Chondrichthye ثاني أكبر الصنوف التي تتضمن أسماك القرش، وسمك الورنك Skates والشفنين Rays، وأسماك الكيميرا Chimaeras. تتكون هياكل الأسماك الغضروفية وفكوكها من الغضروف فقط، وهو يحتوي على كمية من الكالسيوم أقل مما يحتويه العظم، كما أنه أكثر ليونة ومرنة.

معظم أسماك القرش لديها ثمانى زعانف: اثنان صدريتان، وواحدة ذيلية، واثنتان حوضيتان، وواحدة شرجية واثنتان ظهريتان (ولها وظائف الزعانف نفسها في الأسماك العظمية). تكون الزعنفة الذيلية في العديد من أسماك القرش أكبر في الجانب الظهري مقارنة بالجانب البطني. يوفر شكل الزعنفة غير المتاظرة كالتي في القرش الأزرق (الشكل ٢-٤ والصورة ١-٤) مساحة سطح أكبر لتشيي العضلات على الجانب الظهري، الأمر الذي يمنحها سرعة قصوى. وبالمقابل، تتدفع سمكة الشفنين إلى الأمام عن طريق استخدام زعانفها الصدرية.

الأسماك الغضروفية لديها أيضًا جلد قوي مغطى بحراسف شبيهة بالأسنان الصغيرة تُسمى **السنينات Denticles**. تكون هذه الحراسف المتداخلة والمترابطة جميعها في اتجاه واحد، لكن فركها على نحو معakens، يعطيها خاصية الملمس المميزة والمشابهة لملمس

الأسماك، الأمر الذي يسبب حرمان الإنسان من مصدر أساسى للأحماض الدهنية والبروتين فى نظامه الغذائي اليومي.

## الأهمية الاقتصادية للأسماك العظمية

يعد لحم السمك مصدرًا مهمًا للبروتين والخمسة أحماض أمينية أساسية لا يمكن للإنسان تصنيعها؛ كما يحتوى كبد بعض الأسماك، مثل سمك القد، على زيوت تباع غالباً كمكملات غذائية لأنها غنية باليود وفيتامين (A) و (D). وتتوفر مصائد الأسماك في المحيطات وخدمات الصناعات المرتبطة بها دخلاً للعديد من المواطنين عبر توظيفهم في هذا المجال. لكن إذا استمر الصيد الجائر في استنزاف مخزون المحيطات، فسيكون لتربية الأسماك في المستقبل دور متزايد في توفير غذاء الإنسان.

مصائد الأنشوجة البيروفية هي أكبر المصائد أحادية النوع في العالم، ولها أهمية محورية لاقتصاد المجتمعات الأحيائية المحلية. ومع ذلك، قد تتأثر بشدة بظاهرة النينو El Nino المناخية عندما تراجع الرياح التجارية في المحيط الهادئ، الأمر الذي يعيق اختلاط المياه الباردة الغنية بالمعذيات بالمياه الدافئة فوق المنحدر الحراري. ويحدد ذلك من الإنتاجية الأولية فتخفض أعداد أسماك الأنشوجة، وبالتالي يتحول السكان المحليون إلى صيد السردين Sardines، إلى حين عودة الرياح التجارية وزيادة أعداد الأنشوجة البيروفية. ولا تزال تجارة الأنشوجة تعتمد على أنماط ظاهرة النينو المناخية، والتي يبدو أن حدتها ستزداد مع تغير المناخ.

لأجزاء غير الصالحة للأكل من الأسماك أهمية اقتصادية أيضًا، فهي غنية بالنитروجين وفوسفات الكالسيوم، إذ تطحن لاستخدامها غذاءً للأسماك وعلفًا للحيوانات وسمادًا للتربة. ويمكن استخدام الزيت المتبقى لصناعة الصابون، والشمع، والورنيش، والطلاء. كما يمكن استخدام جلد السمك لصناعة الفوانيس أو تحويله إلى غراء. فضلًا عن استخدام حراسف الأسماك لصناعة المجوهرات.

### مصطلحات علمية

#### السنينات : Denticles

نوع من الحراسف المتداخلة التي توفر الحماية وتحسن الكفاءة الهيدروديناميكية في أسماك القرش.

بالضخ Pumped ventilation «إذ إن بعض أسماك القرش يستطيع أن يضخ الماء في داخله فوق خيashieme من دون أن يسبح باستمرار، الأمر الذي يسمح له بنيل قسط من الراحة في قاع المحيط. ولأن الأسماك الغضروفية لا تحتوي على مثانات عموم، فإن عليها الاستمرار في السباحة باتجاه الأمام للبقاء عائمة. للعديد من أنواع الأسماك الغضروفية دور مهم في نظامها البيئي، كمفترسات عليا (الشكل ٩-٤). ويُعد سمك القرش المجفف أو كما يطلق عليه محلياً اسم (العواو) من الأكلات الشعبية المحببة للعmaniin، وينتشر بيعه في العديد من الأسواق العمانية. كما وتُعدّ أسماك القرش (الجرجور) من أكثر الأنواع التي يتم تجفيفها.


### مصطلحات علمية

#### الشقوق الخيشومية Gill slits :

فتحات خارجية من الخياشيم يمكن أن يعود عبرها الماء الذي يبتلعه الفم إلى الخارج.

ورق الصنفية. توفر السنين الحماية لأسماك القرش وتسمح لها بالتحرك عبر الماء بشكل أسرع وأكثر كفاءة وذلك عن طريق تحسين انسيابية سمك القرش خلال سباتها. لا يمكن رؤية الخط الجانبي في الأسماك الغضروفية من الخارج لأنه موجود تحت الجلد.

على عكس الأسماك العظمية، تمتلك الأسماك الغضروفية عدداً من الفتحات المنفصلة التي تساعد في تهوية الخياشيم. فلدى كل من أسماك القرش، وسمك الورنك، والشنفيين خمسة إلى سبعة أزواج من الفتحات الخيشومية على شكل شقوق تسمى **الشقوق الخيشومية Gill slits** على خلف الرأس مباشرة، إضافة إلى فتحة متحوّرة، تُسمى الفتحة التفسية Spiracle، والتي تقع خلف العين تماماً. يدخل الماء إلى هذه الأسماك عن طريق الفم، ويرمى فوق الخياشيم، ثم يخرج من خلال الشقوق الخيشومية. ويمكن لها استخدام طرفيتين: الطريقة الأولى «التهوية بالدفع Ram ventilation» حيث يحصل الكائن على المياه لاحتياجه إلى الأكسجين عن طريق تدفقها فوق خيashieme بالسباحة والتحرك عبر الماء. والطريقة الثانية «التهوية



الشكل ٩-٤ القرش الأزرق كمفترس رئيسي في الشعاب المرجانية.

بعض أنواع الطحالب الكبيرة أيضًا لها **مثاثن هوائية** **Gas bladders** تحت الأنصال. تساعد هذه المثاثن على الطفو للحفاظ على وضعية المنتج بشكل مستقيم، وتتوارد الأنصال في أعلى الطبقة الضوئية حيث تزداد شدة الإضاءة لتقوم بدورها بعملية التمثيل الضوئي.

### مصطلحات علمية

#### **المثبت Holdfast**

تركيب قوي يشبه الجذر يثبت الطحالب الكبيرة في قاع البحر.

#### **الستيب Stipe**

تركيب طويل وقوى وعمودي يشبه ساق النباتات.

#### **الأنصال Blades**

تراكيب تشبه الأوراق تكون معلقة في الماء وتمتص الضوء والأملاح المعدنية.


#### **المثانة الهوائية Gas bladder**

تركيب يحتوي على غاز يوفر الطفو لبعض أنواع الأعشاب البحرية.

## الطحالب الكبيرة

إضافة إلى العوالق النباتية هناك منتجات بحرية أخرى أكبر حجمًا، منها الطحالب الكبيرة التي تضم طحلب الكلب والأعشاب البحرية **Seaweeds**. وهذه الكائنات ذاتية التغذية الضوئية تصنع غذاءها باستخدام طاقة الضوء من الشمس.

معظم أنواع الطحالب الكبيرة تركيب متماثل يمكنها من البقاء في مياه البحار الضحلة والمحيطات (الشكل ١٠-٤).



الشكل ١٠-٤ طحلب الكلب يُظهر سمات وتركيب الطحالب الكبيرة.

يُعرف الجسم الكامل للطحالب الكبيرة باسم الثالوس **Thallus** وله ثلاثة أجزاء رئيسية:

- **المثبت Holdfast**: تركيب قوي يشبه الجذر يثبت طحلب الكلب في قاع البحر ما يمنع تحركه بواسطة التيارات المحيطية القوية أو العواصف.


- **الستيب Stipe**: تركيب طويل وقوى وعمودي يشبه ساق النباتات. يمتد من المثبت ويصل إلى الأنصال. ويكون قويًا جدًا لمنع التكسر.

- **الأنصال Blades**: تراكيب عريضة تشبه الأوراق تكون معلقة في الماء. لها مساحة سطح كبيرة لامتصاص الضوء والأملاح المعدنية.

تُزرع بذور الأعشاب البحرية على شباك أو حبال، والتي تُربط بعد ذلك في منطقة من البحيرة غير مظللة، ويفضل أن تكون درجة الحرارة بين 25°C و 30°C. وبعد فترة من نموها، يتم جمع الطحالب وتعليقها لتجف. ثم تُستخدم في ما يلي:

- **الطهو:** استُخدمت الأعشاب البحرية كغذاء لسنوات من قبل المجتمعات الساحلية في العديد من البلدان، مثل اليابان، وكوريا، وأيسلندا وويلز. ففي اليابان مثلاً، يُستخدم أكثر من 20 نوعاً من الأعشاب البحرية كغذاء، ويتم تجفيف نوع من الطحالب الحمراء وهو البورفيرا *Porphyra* لصنع رقائق النوري *Nori*، وهي شائعة الاستخدام كخلاف تُفَّ بها لفائف السوشي. من الناحية الغذائية، الأعشاب البحرية غنية بالبروتين وبالعديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية، خصوصاً اليود، وهي منخفضة جداً في الدهون. وأكدت دراسة بحثية بجامعة السلطان قابوس، أن الأعشاب البحرية مصدر متكامل للغذاء والدواء.
- **صناعة الأغذية:** تُستخدم الأعشاب البحرية كمصدر للمواد الكيميائية الحيوية المستخدمة لصنع الهلام الصلب والمستحلبات التي تحفظ مواد الأطعمة على شكل معلق، بما في ذلك:
- **الألجينات Alginates:** مادة مستخلصة من الأعشاب البحرية وتُستخدم في صناعة الأغذية كالمثاجات (الآيس كريم)، وفي صناعة لصقات الحروق وملابس رجال الإطفاء.
- **الأجار:** يُستخدم لصنع الهلام النباتي وأيضاً في أطباق الأجار التي تُستخدم عادة في علم الأحياء الدقيقة لتنمية البكتيريا واختبار مقاومة المضادات الحيوية.
- **الكاراجينان Carrageenan:** يُستخدم لصنع الطعام بمجموعة متنوعة من القوام، بما في ذلك مشروبات الحليب بالشوكولاتة وقطع الشوكولاتة بالحليب،

السلالس الغذائية، ما يولد تنوعاً هائلاً في الأنواع البيولوجية.



الصورة ٤-١١ غابة طحلب كلب عملاق.

### الأهمية الاقتصادية للطحالب الكبيرة

قام الإنسان على مدىآلاف السنين بحصاد الطحالب الكبيرة، ومنها طحلب الكلب والأعشاب البحرية. واعتماداً على النوع البيولوجي يمكن حصادها بثلاث طرائق مختلفة: متتصقة بركيزة، وعائمة حرة، أو ملقة على الشاطئ (الصورة ٤-١٢). ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن تأثير هذا الحصاد واسع النطاق على البيئة البحرية.



الصورة ٤-١٢ حصاد الأعشاب البحرية في الفلبين.

- الزراعة المائية: يتم معالجتها لتكوين حبيبات غذاء يمكن استخدامها لتغذية حيوان أذن البحر في مزارع الاستزراع المائي.

وقد نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مسحًا ميدانيًّا لمعرفة أنواع وكميات الأعشاب البحرية في سواحل سلطنة عمان وأهميتها اقتصاديًّا، واستخداماتها وبخاصة الأعشاب البحرية التي تدخل في الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، واحتمالية دخول بعض الأعشاب البحرية كمكونات في عدد من الصناعات السمكية والغذائية.

إذ إنه يستخدم كمادة هلامية مثبتة للزوجة الشوكولاتة.

- مستحضرات التجميل والتداوي بالأعشاب: غالباً ما تُوجَد مستخلصات الأعشاب البحرية في كريمات ترطيب البشرة والعلاجات العشبية لمجموعة من الحالات بما في ذلك التهاب المفاصل، والسل ونزلات البرد.
- السماد: يضاف كمصدر غني بالمعادن إلى الأراضي الزراعية.

#### دراسة حالة ٤-٢



الصورة ٤-١٣ يوفر الساحل بمنطقة الفزایع، غرب صلالة في سلطنة عمان، ظروفاً مثالیة لنمو الطحالب الكبيرة.

فالطحالب تعد مورداً غير مستثمر بشكل كافٍ. وتعمل مساحات واسعة من غابات طحالب الكلب كمخازن للكربون، إذ تمتص الكربون من الغلاف الجوي وتحزننه في نمو نباتات جديدة. تشير التقديرات إلى أن الطحالب الكبيرة تمتص نحو 634 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا على مستوى العالم، وهو أكثر من ضعف صافي الامتصاص الكربوني من الصين - الدولة التي لديها أكبر صافي امتصاص كربوني. يبقى بعض الكربون بالقرب من الشاطئ فيدخل في النظام البيئي المحلي، ويُقدر أن 90% منه ينتهي مذاباً في المياه وينتقل إلى أعماق البحر. لذا، قد تلجأ الدول التي تهدف إلى أن يكون صافي انبعاثات الكربون الصفرى إلى زراعة المزيد من الطحالب.

#### الأهمية البيئية والاقتصادية للطحالب الكبيرة في سلطنة عُمان

الساحل الشاسع الذي تتمتع به سلطنة عمان والذي يبلغ طوله 3165 km بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى البحر، يجعل السلطنة مكاناً مثالياً لتطوير تربية الأحياء المائية، و«استزراع» الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة والنظم البيئية البحرية. منذ عام 2014 وحتى 2022م، زاد إنتاج الاستزراع المائي الذي يتم تطويره حالياً هو الزراعة على نطاق واسع للطحالب الكبيرة.

الطحالب الكبيرة مثل طحلب الكلب والأعشاب البحرية، هي كائنات سريعة النمو تعيش في المنطقة المضاءة من البحر. كشفت دراسة أجريت في عام 2018م أن هناك 402 نوع مختلف من الطحالب الكبيرة في مياه سلطنة عُمان، الأمر الذي يدل على تنوع ووفرة كبيرين في الحياة، وخصوصاً على سواحل محافظة ظفار Dhofar (الصورة ٤-١٢). تتأثر هذه المنطقة من الساحل بالرياح الموسمية؛ إذ تسبب الرياح المستمرة حركة أمواج قوية وتغيرات صاعدة للمياه، ما يؤدي إلى زيادة مستويات المعادن وانخفاض درجات حرارة المياه. وقد ظهر العديد من الأنواع الجديدة في عُمان أكبر حجماً مقارنة بالأنواع المعروفة الأخرى، ربما بسبب هذه الظروف المناسبة.

ويشكل ذلك جزءاً من خطط سلطنة عمان لتوسيع تربية الأحياء المائية والاستخدام المستدام لهذا المورد الاقتصادي غير المستثمر خلال العقود القادمة (الشكل ١١-٤).


#### أسئلة

١. باستخدام معرفتك بدورة الكربون، اشرح كيف تعمل الطحالب الكبيرة كمخازن للكربون.
٢. وضح: لماذا تُعد الطحالب الكبيرة مورداً متجدداً عند استخدامها كوقود حيوي؟
٣. إذا تم استخدام الطحالب الكبيرة كوقود حيوي، فإن الكربون في هذه الطحالب سيتم إطلاقه في الغلاف الجوي. لماذا برأيك لا يُعد ذلك مشكلة للتغير المناخي؟
٤. اقترح بعض الإيجابيات والسلبيات في تطوير السياحة البيئية في غابات طحلب الكلب في عُمان.

فالطحالب تميز أيضاً بمقدرتها على تنقية المياه وتوفير الغذاء للنظام البيئي، وتشكل أساساً لشبكات غذائية كبيرة. ويمكن للمجتمع المحلي استثمار هذا العمل في تشجيع السياحة البيئية، طالما يتم بطريقة مسؤولة ولا تؤثر سلباً على النظام البيئي.

وبالمقابل، يمكن زراعة الطحالب كمورد للإنسان، وقد تم إجراء بحوث تتعلق باستخدام الطحالب كوقود حيوي، عوضاً من الوقود الأحفوري، وتُعد الطحالب الكبيرة عند استخدامها كوقود حيوي مورداً متجدداً. هناك استخدامات أخرى للطحالب الكبيرة المعالجة أيضاً - منها الأطعمة، والمنتجات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، ومستحضرات التجميل، والأسمدة، والصمغ الصناعي (الغراء). ويُقدر أن زراعة الأعشاب البحرية ينتج منها أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وأن الطلب على منتجات الأعشاب البحرية يتجاوز الموجود فعلاً (الشكل ١١-٤).

هناك موقع غنية بالطحالب الكبيرة على سواحل الدقم والشرقية، حيث يمكن تطوير مزارع الأعشاب البحرية.




الشكل ١١-٤ إنتاج الاستزراع المائي في سلطنة عمان ٢٠٠٠ - ٢٠٢١ م.

أو المانجروف (Mangrove trees)، ومغمورة (على سبيل المثال الحشائش البحرية Seagrasses).

توجد الحشائش البحرية في المنطقة الضوئية، على الجرف القاري الممتد إلى البحر (الشكل ١٢-٤).

## النباتات البحرية

النباتات الزهرية هي أقل شيوعاً في مصبات الأنهر والبيئات البحرية مما هي عليه في اليابسة. وقد تكون على أحد الأشكال الآتية: طافية (على سبيل المثال زنبق الماء Water lilies)، ونابعة (على سبيل المثال شجرة القرم



الشكل ١٢-٤ موقع مروج الحشائش البحرية.

يشمل تركيب **الورقة Leaf** في النباتات البحرية طبقة بشرة تحوي البلاستيدات الخضراء (التي تغيب في بشرة معظم نباتات اليابسة) لزيادة التمثيل الضوئي، وتكون الأوراق بلا ثغور، وبقشرة شمعية رقيقة جداً بحيث تتمكن خلاياها من الحصول على أيونات الأملاح المعدنية مباشرةً من الماء. وتحوي أيضاً عدداً قليلاً من الحزم الوعائية، إذ إنها ليست بحاجة إلى نقل الماء والأملاح المعدنية عبر النبات. كما أن الأوراق مرنة فلا تتكسر بفعل تيارات الماء. الأوراق والجذور متلائمة فيسولوجيًّا للعيش في ماء البحر بحيث تستطيع خلاياها البقاء في المياه المالحة من دون فقدان الماء عن طريق الخاصية الأسموزية.

#### مصطلحات علمية

##### **الجذر Root**

تركيب في قاعدة النبات يثبته في الركيزة ويمتص المغذيات من الرواسب.


##### **الرايزومات Rhizomes**

تراكيب أفقية تحت الأرض تُمكّن الحشائش البحرية من التكاثر اللاجنسي.

##### **الورقة Leaf**

عضو التمثيل الضوئي في النباتات.


تتلاءم الحشائش البحرية للحياة على الجرف القاري، فهي لديها نظام **جذور Roots** مع **رايزومات Rhizomes** (الشكل ١٣-٤). يثبت نظام الجذر الحشائش البحرية في قاع البحر بحيث لا تتحرك بفعل تيارات المياه المتغيرة وحركة الأمواج. كما تتمكن الرايزومات الأفقية للحشائش البحرية من التكاثر اللاجنسي.



الشكل ١٣-٤ الحشائش البحرية تُظهر سمات النباتات البحرية.

تمثل مروج حشائش البحر مصبات كربون ومصادر أكسجين تعزز بيئة بحرية صحية. فأوراق حشائش البحر الطويلة والرفيعة تساعد على امتصاص حركة الأمواج والتيارات البطيئة، والتقليل من التعرّق عن طريق احتجاز الطمي. وترتبط أنظمة جذورها الكثيفة المتشاركة الرواسب الناعمة، كما تساعد في المحافظة على جودة المناطق الساحلية عن طريق امتصاص الجريان السطحي من نظم اليابسة البيئية.

العديد من النظم البيئية للنباتات البحرية يتواجد في توازن دقيق بين الأنواع. فعلى سبيل المثال، إذا انخفضت أعداد الجماعة الأحيائية لسلامف البحر بشكل كبير، تموت الحشائش البحرية ويحل مكانها الطحالب. ولمكافحة ذلك، يمكن للقائمين بالحفاظ على البيئة استخدام فقايسات السلاحف لزيادة أعداد سلامف البحر المحلية (الصورة ١٤-٤)، الأمر الذي يزيد من خصوبة قاع البحر ويحفّز النمو الجيد لحشائش البحر، كما تساعد على نشر هذه الحشائش. ومع ذلك، إذا أصبحت أعداد السلاحف كبيرة جدًا، فسيتم استهلاك حشائش البحر بشكل مفرط وتموت. وقد يحدث هذا في المناطق التي تتخلص فيها أعداد أسماك القرش المفترسة بسبب الصيد الجائر.



الصورة ١٤-٤ استخدام فقايسة السلاحف ضمن مشروع الحفاظ على السلاحف البحرية.

يمكن لهذه النباتات التكاثر جنسياً ولاجنسياً أيضاً. ففي التكاثر الجنسي، تُنتج **أزهاراً Flowers** تطلق حبوب اللقاح التي يحملها الماء إلى أزهار أخرى.


#### مصطلحات علمية

**الزهرة Flower:** عضو التكاثر الجنسي في النبات.

#### الأهمية البيئية للنباتات البحرية

النباتات البحرية هي أساس المجتمعات الأحيائية المائية ذات التنوع البيولوجي الواسع. يجعلها حساسيتها لجودة المياه أنواعاً أساسية مهمة قد تساعد في تحديد الصحة العامة للنظم البيئية الساحلية.

إن النباتات البحرية والعوالق النباتية هي المنتجات السائدة في المواطن البيئية لمصبات الأنهر، وهي مصدر غذاء مباشر للمستهلكات الأولى البحرية. تمثل حشائش السلفادا *Thalassia testudinum*، الموجودة في خليج المكسيك والبحر الكاريبي وبرمودا مصدراً غذائياً حيوياً للسلاحف وخراف البحر والأسماك آكلات الأعشاب (الشكل ١٤-٤). وفي شبه جزيرة برّ الحكمان في ولاية محوت، يتوافر نوعان من الحشائش البحرية هما حشائش البحر ضيق الأوراق *Halodule uninervis*، ومحب الملح البيضاوي *Halophila ovalis*، وبُعد كلاهما غذاءً أساسياً للسلاحف الخضراء. وتتوفر بقايا حشائش البحر الميتة طاقة عضوية للديدان وخيار البحر والسرطانات وشوكيات الجلد وشقائق النعمان البحرية، كما توفر حشائش البحر طوال العام لبعض أنواع الأسماك موطنًا بيئياً لتعشيش وحضانة أنواع أخرى.



الشكل ١٤-٤ الأهمية البيئية لمروج الحشائش البحرية.

البيئية الحماية الجسدية للمجتمعات الأحيائية الساحلية من التجوية والتعرية والفيضانات في أثناء العواصف. كما توفر أشجار المانجروف الخشب لأغراض إشعال النار والبناء، وتستخدم حشائش البحر كمادة عزل في بناء المنازل، ونسج الأثاث، وتغطية الأسقف، وصنع الضمادات، وحشو المفارش، وتسميد الحقول. وهكذا تؤدي مشاريع السياحة البيئية، مثل رياضة الغوص لمراقبة خراف البحر، دوراً متزايداً في الاقتصادات المحلية.

وتحتوي شبه جزيرة بــ الحكمان على أكبر تجمع بيئي بكراً لأشجار القرم (المانجروف)، حيث تقدر مساحة هذه الأشجار بنحو 162 هكتاراً، وهي وجهة شهيرة برحلات التخييم والاستجمام، حيث تتميز بتجربة سياحية فريدة من نوعها للاستمتاع بالعناصر الطبيعية الموجودة فيها.

لذا، تحتاج المواطنون البيئيون لحشائش البحر المتضررة إلى برامج إعادة ترميم شاملة لحماية هذه المحميات الطبيعية والحساسة بيئياً عن طريق تضافر الآتي:

- حماية تكاثر السلاحف وتعيشها (الصورة ٤-٤).
- حظر صيد أسماك القرش.
- تقييد ممارسات الصيد وتربية الأحياء المائية واستخدام الأراضي الساحلية.

### **الأهمية الاقتصادية للنباتات البحرية**

تأتي الأهمية الاقتصادية للنباتات البحرية من خلال الصناعات التي تدعمها بشكل غير مباشر. وكون النباتات البحرية تشكل أرضية حاضنة للعديد من الكائنات الحية فهي حيوية للصيد التجاري والترفيهي. كما توفر مواطنها

### **أسئلة**

انقل الجدول ٣-٤ وأكمله لتوضيح كيفية تصنيف كل نوع.

التصنيفي التسلسل الهرمي	نجم البحر المكلل بالأشواك	كرييل القطب الجنوبي	سمك القرش الأزرق	الأشوكة البيروفية (سمكة البيلم)
النطاق		حقيقة النوع		حقيقة النوع
المملكة			الحيوانية	
الشعبة			الحبيبات	الحبيبات
الطاقة				الأسماك العظمية
الرتبة			بنكيات	كلوبيفورمس
العائلة			القشريات الرخوة	إنغراوليدي
الجنس			الكريليات	كاركارينيدي
النوع				

الجدول ٣-٤ تصنیف أنواع بحرية.

- الأرجوانية على مجموعة من الأنواع، بما في ذلك قنافذ البحر وبلح البحر.
- أ. اشرح أثر إزالة نجوم البحر الأرجوانية من على الشعاب المرجانية.
- بــ. نقاش: لماذا يمكن اعتبار نجم البحر الأرجوانى نوعاً أساسياً؟

٤ يُعدّ نجم البحر الأرجوانى (*Pisaster ochraceus*) مثالاً على شوكيات الجلد، وهو نوع أساسي في المجتمعات الأحيائية للشعاب المرجانية. إن هذا الحيوان ليس من المفترسات التي تشغل قمة الهرم الغذائي؛ لأنّه من فرائس أسماك القرش والرّاي (سمك الشفنين البحري) وشقائق نعمان البحر. تتغذى نجوم البحر

## مشروع: مسرحية بحرية

واحدًا عن كل مجال من المجالات المذكورة سالفًا) لتقديمه إلى زملائهما في الصف. بعد القيام بتصحيح الاختبار، تدارسا النتائج وحللا الأسئلة لتحديد الأسئلة التي لم يتمكن بقية الزملاء في الصف من الإجابة عنها على نحو صحيح. تأمل في كيفية تحسين العرض في المرات القادمة لجعله أفضل.

تأمل في العروض الأخرى التي قدمها الزملاء في الصف:

- أي العروض كان الأكثر غنىً بالمعلومات؟
  - هل هذه العروض هي ذاتها التي استمتعت بها أكثر؟
- اقتصر ثلث طرائق يمكن أن تحسن بها عرضك الخاص لجعله أكثر غنىً بالمعلومات وإثارة للاهتمام.

اختر بالتعاون مع زميلك كائناً حيًا أثار اهتمامكما أو شاهدتماه مؤخرًا في مقال أو تقرير إخباري محلي أو دولي. أعدّا عرضاً درامياً مدته ثلاثة دقائق لتقديمه أمام باقي الزملاء، على أن يغطي العرض المجالات الآتية:

- تصنيف النوع.
- الدور البيئي للنوع بما في ذلك مفترساته و/أو فرائسه.
- القيمة الاقتصادية للنوع.
- تأثير الإنسان على النوع.
- الحفاظ على النوع.

## التفكير في المشروع

أعدّا اختباراً من نوع «اختيار من متعدد» مكتوبًا يتضمن 5 أسئلة استناداً إلى عرضكم الدرامي (على أن يتضمن سؤالاً

## ملخص

يمكن تصنيف الكائنات الحية باستخدام التسلسل الهرمي التصنيفي: النطاق، المملكة، الشعبة، الطائفة، الرتبة، العائلة، الجنس، والنوع. يُشار إلى الأنواع بحسب ما هو متعارف عليه بالتسمية الثنائية وبخط مائل.
يمكن استخدام مفتاح التشغيل الثنائي لتحديد النوع باستخدام الخصائص الجسمية.
الرسوم البيولوجية تسجل صورة، وسمات وصفات وتراكيب مهمة للعينة. يتم رسمها بخطوط واضحة ومتصلة وبمقاييس مناسبة. تضاف إليها مسميات السمات الرئيسية ويمكن إضافة شروح توضيحية إذا لزم الأمر.
المجموعات الرئيسية للكائنات البحرية هي: العوالق النباتية، والعوالق الحيوانية، وشوكيات الجلد، والقشريات، والأسماك العظمية، والأسماك الغضروفية، والطحالب الكبيرة، والحشائش البحرية.
العوالق النباتية هي منتجات دقيقة. تشمل الدياتومات والسوطيات الدوّارة.
العوالق الحيوانية هي مستهلكات. تشمل اليرقات، ومجاديفيات الأرجل، والكريل، والحيوانات الكبيرة منها قناديل البحر.
شوكيات الجلد هي لاقارييات بحرية تشمل خيار البحر، ونجوم البحر، وقنافذ البحر، وزنابق البحر ونجوم البحر المهاشة. تمثل جسمها خماسي ولها أقدام أنبوبية تستخدمها للتเคลل.
قد تدمر نجوم البحر المكللة بالأشواك وهي من شوكيات الجلد مساحات مرجانية كبيرة إذا ازدادت أعداد جماعتها الأحياء بسرعة كبيرة. وقد تدمر قنافذ البحر أيضاً غابات طحلب الكلب إذا تركت من دون رقابة. تعمل أفراد خيار البحر على تنقيمة المياه وتوفير المغذيات على الشواطئ الرملية.
يمكن استخدام شوكيات الجلد في الزراعة، والصيد، والغذاء والصناعات العلمية. وقد يؤدي الحصاد المفرط (صيدها) إلى مشكلات.
القشريات هي لاقارييات تشمل جراد البحر وسرطان البحر، والروبيان والكريل. لديها درع واق، وبطن مقسم إلى قطع، وأرجل مفصلية، وزوجان من قرون الاستشعار، وأرجل مفصلية للحركة والإفراز والحماية والمساعدة على التكاثر الجنسي.
الأسماك العظمية هي فقاريات تشكل غالبية الأسماك. لديها هيكل عظمي، وغضاء خيشومي، وخياشيم، ومثانة عوم، وحراشف، وخط جانبي مرئي من الخارج، وزعانف (صدرية، ذيلية، وحوضية، وشرجية وظهرية).
وظائف سمات الأسماك العظمية هي: - الهيكل العظمي: الدعم والحركة - الغطاء الخيشومي: حماية وتهوية الخياشيم - الخياشيم: التهوية الفازية - مثانة العوم: العوم/الطفو - الحراشف: الحماية - الخط الجانبي: الأعضاء الحسية للحركة والتเคลل والإفراز - الزعانف: التเคลل والتوازن.
الأسماك العظمية مسؤولة عن حركة ومعالجة نسبة كبيرة من المواد العضوية البحرية والمغذيات. ولها دور رئيسي في عدة شبكات غذائية، منها الشبكات الغذائية التي تحتوي على الأنشوجة البيروفية.
صيد الأسماك العظمية هو قطاع مهم من نشاط الإنسان، يوفر فرص العمل وإعالة للعديد من السكان حول العالم. قد تؤثر ظواهر المناخ، مثل النينو، على صيد الأنشوجة البيروفية والاقتصاد المحلي.
الأسماك الغضروفية هي فقاريات لها عمود فقري وهيكل من الغضروف، لا العظم. ولديها أيضاً شقوق خيشومية، وخياشيم، وسنینات، وخط جانبي، وزعانف (صدرية، ذيلية، وحوضية، وشرجية، وظهرية). تشمل أسماك القرش، وسمك الورنك، وسمك الشفنين، وأسماك الكيميرا.
الطحالب الكبيرة هي منتجات بحرية، بما في ذلك طحلب الكلب والأعشاب البحرية. ومن سماتها وتراكيبها المكونة: المثبت، والستيب، والأنصال، والمثانة الهوائية. يقوم المثبت بثبيت الطحالب الكبيرة في قاع البحر، ويربط النصل بالمثبت، وتمتص الأنصال الضوء والمعادن، وتتوفر المثانة الهوائية القدرة على الطفو.

تابع

الطحالب الكبيرة ومنها طحلب الكلب مهمه كأساس للعديد من الشبكات الغذائية، وفي توفير كميات كبيرة من المواد العضوية المحتلة للنظم البيئية القريبة من الشاطئ. وهي مفيدة في دورات المغذيات.

تُستخدم الطحالب الكبيرة في صناعة الغذاء بطرق متعددة، وفي مستحضرات التجميل، والأسمدة والاستزراع المائي. وقد توفر فوائد إضافية كمخازن للكربون.

النباتات البحرية، مثل حشائش البحر أو أشجار القرم أو المانجروف، قد تكون طافية، أو نابعة أو مغمورة. سماتها وترابكبيها تشمل الرايزومات، والجذور، والأزهار، والأوراق. يقوم الجذر بتثبيت النبات وامتصاص المغذيات، والرايزوم للتکاثر اللاجنسي، والورقة عضو التمثيل الضوئي، والزهرة للتکاثر الجنسي.


النباتات البحرية هي المنتجات السائدة في العديد من النظم البيئية البحرية، وتدعى شبكات غذائية كبيرة ومتنوعة. لها دور مهم في دورات المغذيات وهي مواطن بيئية لكائنات أخرى.

النباتات البحرية تدعم بشكل غير مباشر العديد من أنشطة الإنسان منها الصيد. وقد تكون مفيدة في منع الانجراف وتوفير مواد البناء. في الآونة الأخيرة، ازدادت أهميتها كمخازن للكربون وللسياحة البيئية.

## أسئلة نهاية الوحدة

- [1] ١ ما الترتيب الصحيح للسلسل الهرمي التصنيفي، من الأكبر إلى الأصغر؟
- أ. النطاق، المملكة، الشعبة، الطائفة، الرتبة، العائلة، الجنس، النوع.
  - ب. المملكة، النطاق، الطائفة، الشعبة، الرتبة، العائلة، الجنس، النوع.
  - ج. النطاق، المملكة، الشعبة، الرتبة، الطائفة، العائلة، الجنس، النوع.
  - د. النطاق، المملكة، الجنس، الشعبة، الطائفة، الرتبة، العائلة، النوع.
- [1] ٢ تم اكتشاف نوع من الكائنات الحية يتميز بالسمات التالية: الشقوق الخيشومية، والسنينات، والخط الجانبي، والزعانف. إلى أي مجموعة من المجموعات الآتية تتمي أفراد هذا النوع؟
- أ. القشريات.
  - ب. الأسماك العظمية.
  - ج. العوالق الحيوانية.
  - د. الأسماك الغضروفية.
- [1] ٣ أيّ من الآتي هو سمة من سمات شوكيات الجلد؟
- أ. الأرجل المفصليّة.
  - ب. التماثل الخماسي.
  - ج. الشقوق الخيشومية.
  - د. الرعنفة الظهرية.
- [المجموع: 3]

تبين الصورة ١٥-٤ ستة أنواع بحرية:



الصورة ١٥-٤

أ. استخدم مفتاح التшиعيب الثنائي أدناه لتحدد كل نوع من الأنواع البحرية الموضحة.

لا	نعم	
اذهب إلى الرقم ٢	قنديل البحر العادي	١. كائن حي له نوامس
اذهب إلى الرقم ٣	بزاق البحر	٢. كائن حي له قرون استشعار
اذهب إلى الرقم ٤	فرس البحر	٣. كائن حي يسبح بوضع رأسية وله زعنفة ظهرية بازرة
اذهب إلى الرقم ٥	شعبان البحر موراي الأخضر	٤. كائن حي جسمه طويل
سمكة النهاش الأحمر	سمكة المهرج	٥. كائن حي له أشرطة

اكتب الحرف المناسب بجانب اسم كل كائن حي.

- قنديل البحر العادي.

- بزاق البحر.

- فرس البحر.


- شعبان البحر موراي الأخضر.

- سمكة المهرج.

- سمكة النهاش الأحمر.

[المجموع: 4]

الشكل ١٥-٤ الآتي هو رسم بيولوجي لخيار البحر، وهو أحد أنواع شوكيات الجلد.




الشكل ١٥-٤

- [1] أ. اذكر سمة واحدة موجودة في الشكل تُعدّ ميزة خاصة لشوكيات الجلد.
  - [1] ب. اذكر سمة واحدة من الشكل لا تُعدّ ميزة خاصة لشوكيات الجلد الأخرى.
  - [1] ج. يُعدّ خيار البحر نوعاً رئيسياً في محمية غالاباجوس البحرية. اذكر المقصود بنوع رئيسى.
  - [2] د. صِف الأهمية البيئية لليرقات العوالقية وخيار البحر البالغ.  
هـ. يُعدّ خيار البحر طعاماً شهياً ولذيناً في آسيا، ففي عام 1992م بدأ الصيد التجاري لخيار البحر حول جزر غالاباجوس. وفي عام 1999م، تم تحديد موسم معين لصيد خيار البحر وتحديد حجم أدنى للصيد للحد من الصيد الجائر، ولكن هذه الإجراءات لم تنجح في منع الصيد الجائر، وحدث انهيار في مخزون خيار البحر في عام 2005م. تباً بالآثار الاقتصادية لهذا الانهيار على المجتمع المحلي.
- [المجموع: 7]

٦

- [2] أ. سرطان البحر الأخضر، *Carcinusmaenas*، هو نوع غازي من القشريات يوجد الآن في ولاية مين Maine، في الولايات المتحدة الأمريكية. اذكر اثنتين من سمات القشريات.
- ب. الشكل ١٦-٤ أدناه يظهر الاعتماد البيئي المتبادل بين درجة حرارة المحيط، وسرطان البحر الأخضر والمحار.



الشكل ١٦-٤

- [2] ١. صِف العلاقة بين درجة حرارة المحيط وسرطانات البحر الخضراء.
- [3] ٢. صِف العلاقة بين توزيع سرطانات البحر الخضراء والمحار، واقتصر تفسيرًا لها.

[المجموع: 7]

تُعد طحالب الكلب من المنتجات البحرية المهمة، والتي غالباً ما تنمو في المياه الساحلية على شكل غابات كثيفة.


- [3] أ. أعطِ ثلاثة سمات لطحلب الكلب نموذجي.
- ب. اذكر استخدامَيْن لحصاد الطحلب الكبيرة، والتي منها الأعشاب البحرية أو طحلب الكلب.
- [2] ج. في منطقة من البحر قبالة ساحل إسكتلندا، تغذى قنافذ البحر على طحلب الكلب وتفترسها بدورها ثعالب البحر.

- [1] ١. ارسم هذه السلسلة الغذائية.
٢. تسبب الصيد والتلوث في تقليل أعداد أفراد الجماعة الأحيائية لثعالب البحر في بعض المناطق. تبأ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على وفرة طحلب الكلب.
- [2] ٣. اقترح: كيف ولماذا يمكن أن يؤثر تقليل كثافة طحلب الكلب على حصاد الأسماك في المستقبل؟

[المجموع: 10]

٧

- أ. صِف ثلاثة اختلافات بين نوعي الحشائش البحرية الظاهرتين في الشكل ١٧-٤ أدناه.




الشكل ١٧-٤

ب. تعيش أسماك قرش النمر في المياه الساحلية الضحلة قبالة هاواي، حيث تصطاد وتقتل وتأكل السلاحف البحرية. وبدورها فإن السلاحف البحرية، تتغذى على حشائش البحر. تتباً بالتأثير البيئي لأنخفاض أعداد الجماعة الأحيائية لأسماك قرش النمر بسبب الصيد الجائر في المحيط الهادئ.

[3]

[المجموع: 6]

إن النوع السائد من الكريل في المحيط القطبي الشمالي هو الكريل الشمالي، *Meganyctiphanes norvegica*. يُظهر الشكل ١٨-٤ الآلي المكانة الغذائية لكريل في شبكة غذائية للقطب الشمالي.



الشكل ١٨-٤

يتم اصطياد الحيتان البيضاء في مناطق القطب الشمالي الكندية والألاسكية والروسية من أجل لحومها ودهنها وجلدها. فسّر كيف يمكن أن يؤثر صيد الحيتان البيضاء على أعداد الجماعة الأحيائية لكريل القطب الشمالي في السلسلة الغذائية الآتية:

العوالق النباتية → الكريل الشمالي → الأسماك الصغيرة → الحوت الأبيض

[المجموع: 2]

**قائمة تقييم ذاتي**

بعد دراسة الوحدة، أكمل الجدول الآتي:

أرجح الموضوع	واثق من الاستمرار	أقترب من تحقيق الهدف	احتاج إلى بذل المزيد من الجهد	أستطيع أن
١-٤				أصنف تصنيف الأنواع في التسلسل الهرمي التصنيفي للنطاق، والمملكة، والشعبية، والطائفة، والرتبة، والجنس، والنوع.
١-٤				أصنف وأستخدم نظام التسمية الشائبة لتسميات الأنواع.
١-٤				أصمم وأستخدم مفاتيح التشغيل الشائبة البسيطة التي تعتمد على سمات يمكن تحديدها بسهولة.
١-٤				أسجل ملاحظات وأنفذ رسوماً بيولوجية من عينات أو صور فوتوغرافية لكتائب بحرية رئيسية.
٢-٤				أعرّف العوالق على أنها مجموعة متنوعة من الكائنات الحية المجهرية بشكل عام والتي لديها قدرة محدودة على الحركة، وتتجرف مع التيارات المائية.
٢-٤				أصنف العوالق النباتية كمنتجات تمتضي المغذيات من بيئتها وتحصل على غذائها بواسطة عملية التمثيل الضوئي؛ وتشمل الطحالب المجهرية مثل الدياتومات والسوطيات الدوارة.
٢-٤				أذكر أن العوالق الحيوانية هي مستهلكات؛ ومنها اليرقات، ومجدافيات الأرجل، وحيوانات كبيرة مثل قناديل البحر.
٢-٤				أصنف وأحدد السمات الرئيسية لشوكيات الجلد النموذجية البالغة، والتي تقتصر على التماثل الخماسي والأقدام الأنبوية.
٢-٤				الخُص وظائف الأقدام الأنبوية في شوكيات الجلد النموذجية البالغة.
٢-٤				الخُص الأهمية البيئية والاقتصادية لشوكيات الجلد، بما في ذلك نجم البحر المكلل بالأشواك.
٢-٤				أصنف وأحدد السمات الرئيسية للقشريات البالغة النموذجية، بما في ذلك الدرع، والبطن المجزأة، والأرجل المفصليّة، وزوجان من قرون الاستشعار.
٢-٤				الخُص وظائف الدرع ، والأرجل المفصليّة في القشريات البالغة النموذجية.
٢-٤				الخُص الأهمية البيئية والاقتصادية للقشريات، بما في ذلك كريل القطب الجنوبي.

## قائمة تقييم ذاتي (تابع)

أرجح الموضع	واثق من الاستمرار	أقرب من تحقيق الهدف	أحتاج إلى بذل المزيد من الجهد	أستطيع أن
٢-٤				نصف وأحدّد السمات الداخلية والخارجية الرئيسية لسمكة عظمية باللغة نموذجية، بما في ذلك الخياشيم، والغطاء الخيشومي، والخط الجنسي المرئي من الخارج، والحراسف، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية) والهيكل العظمي، ومثانة العوم.
٢-٤				اللُّخْص وظائف الخياشيم، والغطاء الخيشومي، والخط الجنسي المرئي من الخارج، والحراسف، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والهيكل العظمي، ومثانة العوم في الأسماك العظمية باللغة النموذجية.
٢-٤				اللُّخْص الأهمية البيئية والاقتصادية للأسماك العظمية، بما في ذلك سمة الأنشوجة البيروفية.
٢-٤				نصف وأحدّد السمات الداخلية والخارجية الرئيسية لسمكة غضروفية باللغة نموذجية، بما في ذلك الهيكل الغضروفي، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والسننات، والخط الجنسي، والخياشيم، والشقوق الخيشومية.
٢-٤				اللُّخْص وظائف الهيكل الغضروفي، والزعانف (الصدرية والذيلية والحوضية والشرجية والظهرية)، والسننات، والخط الجنسي، والخياشيم، والشقوق الخيشومية لسمكة غضروفية باللغة نموذجية.
٢-٤				نصف وأحدّد السمات الرئيسية للطحالب الكبيرة النموذجية، مثل طحلب الكلب، بما في ذلك المثبت، والستيب، والأنصال والمثباتات الهوائية.
٢-٤				اللُّخْص وظائف المثبت، والستيب، والأنصال والمثباتات الهوائية للطحالب الكبيرة النموذجية.
٢-٤				اللُّخْص الأهمية البيئية والاقتصادية للطحالب الكبيرة، بما في ذلك طحلب الكلب.
٢-٤				نصف وأحدّد السمات الرئيسية لنبات بحري نموذجي، مثل حشائش البحر، بما في ذلك الجذور والرايزومات والأوراق والأزهار.
٢-٤				اللُّخْص وظائف الجذر، والرايزوم، والأوراق، والأزهار لنبات بحري نموذجي.
٢-٤				اللُّخْص الأهمية البيئية والاقتصادية لنباتات البحرية، بما في ذلك حشائش البحر.

# مصطـلـحـات

## المصطلحات

\***الإثـراءـ الغـذـائـيـ** **Eutrophication**: عملية إثـراءـ المـسـطـحـ المـائـيـ بالـمـغـذـيـاتـ الـذـائـبـ (ـمـثـلـ الـنـتـرـاتـ وـالـفـوـسـفـاتـ)ـ الـتيـ تـحـفـزـ نـمـوـ الـمـنـتـجـاتـ،ـ ماـ يـؤـدـيـ عـادـةـ إـلـىـ اـسـتـفـادـ الـأـكـسـجـينـ الـمـذـابـ.ـ (ـصـ ٩٤ـ)

**احـترـاقـ** **Combustion**: اـحـترـاقـ شـيءـ مـاـ،ـ مـثـلـ اـحـترـاقـ الـوقـودـ الـأـحـفـوريـ لـاستـخـدـامـ طـاقـتهـ.ـ (ـصـ ٣٤ـ)

\***الـإـحـصـاءـ** **Statistics**: مـمارـسةـ جـمـعـ وـتـحـلـيلـ وـتـفـسـيرـ الـبـيـانـاتـ الـعـدـديـةـ الـتـيـ تـكـونـ كـمـيـاتـهاـ بـكـبـيرـةـ وـيـشـمـلـ ذـلـكـ طـرـائقـ مـرـاجـعـةـ الـبـيـانـاتـ وـاسـتـخـلـاصـ الـاستـتـجـاجـاتـ منـ هـذـهـ الـبـيـانـاتـ.ـ الـإـحـصـاءـ هـوـ طـرـيقـةـ لـرـؤـيـةـ الـأـنـمـاطـ فـيـ الـبـيـانـاتـ الـعـدـديـةـ أـوـ لـتـحـدـيدـ مـاـ إـذـاـ كـانـ الـبـيـانـاتـ تـظـهـرـ فـرـوـقـاـ بـيـنـ طـرـيقـتـيـنـ تـعـتمـدـانـ لـمـعـالـجـتهاـ.ـ (ـصـ ٥٣ـ)

**الـإـخـرـاجـ** **Excretion**: عمـلـيـةـ التـخلـصـ مـنـ الـفـضـلـاتـ الـتـيـ تـكـونـهاـ الـتـفاعـلـاتـ الـكـيـمـيـائـيـةـ دـاخـلـ الـخـلـاـيـاـ الـحـيـةـ.ـ (ـصـ ١٠٤ـ)

**ازـهـارـ الطـحالـبـ** **Algal bloom**: زـيـادةـ سـرـيعـةـ فـيـ أـعـدـادـ الـجـمـاعـةـ الـأـحـيـائـيـةـ لـلـطـحالـبـ.ـ (ـصـ ٨٧ـ)

**الـاسـتـدـامـةـ** **Sustainability**: الـقـدرـةـ عـلـىـ تـلـيـةـ اـحـتـيـاجـاتـ الـحـاضـرـ دـونـ الـمـسـاسـ بـقـدـرـةـ الـأـجيـالـ الـقـادـمـةـ عـلـىـ تـلـيـةـ اـحـتـيـاجـاتـهاـ.ـ (ـصـ ٢٠ـ)

**الـأـسـماـكـ الـعـظـيمـةـ** **Bony fish**: الـأـسـماـكـ الـتـيـ لهاـ هـيـكلـ عـظـيمـ وـهـيـ تمـثـلـ طـائـفـةـ الـأـسـماـكـ الـعـظـيمـةـ Osteichthyesـ.ـ (ـصـ ١٢٥ـ)

**الـأـسـماـكـ الـغـضـروـفـيـةـ** **Cartilaginous fish**: الـأـسـماـكـ الـتـيـ لـديـهاـ فـكـوكـ وـهـيـاـكـلـ مـنـ الغـضـارـيفـ وـهـيـ تمـثـلـ طـائـفـةـ الـأـسـماـكـ الـغـضـروـفـيـةـ Chondrichthyesـ.ـ (ـصـ ١٢٥ـ)

**الـاعـتـراضـ** **Interception**: حـبـ الـأـمـطـارـ عـنـ طـرـيقـ الـغـطـاءـ الـنبـاتـيـ،ـ وـمـنـعـهاـ مـنـ الـوصـولـ إـلـىـ الـتـرـبةـ.ـ (ـصـ ٢٣ـ)

\***أـكـلـ الـأـعـشـابـ** **Herbivore**: كـائـنـ حـيـ يـأـكـلـ الـنـبـاتـاتـ فـقـطـ،ـ وـيـعـرـفـ أـيـضـاـ بـاسـمـ الـمـسـتـهـلـكـ الـأـوـليـ.ـ (ـصـ ٢٨ـ)

\***أـكـلـ الـلـحـومـ** **Carnivore**: كـائـنـ حـيـ يـأـكـلـ الـلـحـومـ فـقـطـ،ـ وـيـؤـدـيـ غالـبـاـ دـورـ الـمـسـتـهـلـكـ الـثـالـثـيـ.ـ (ـصـ ٢٨ـ)

## الأفعال الإجرائية

**احـسـبـ** **Calculate**: أـوـجـدـ الـحـلـ اـسـتـنـادـاـ إـلـىـ الـحـقـائـقـ أـوـ الـأـرـقـامـ أوـ الـمـعـلـومـاتـ الـمـقـدـمةـ.

**ارـسـمـ** **Sketch**: أـنـشـئـ رـسـمـاـ تـخـطـيـطـاـ بـسـيـطـاـ يـوضـحـ الـمـلامـحـ الـرـئـيـسـيـةـ.

**بـرـرـ** **Justify**: اـدـعـ الـمـوـضـوـعـ بـالـأـدـلـةـ وـالـحـجـةـ.

**اذـكـرـ** **State**: عـبـرـ بـكـلـمـاتـ وـاضـحةـ.

**اـشـرـ** **Explain**: اـعـرـضـ الـأـهـدـافـ أـوـ الـأـسـبـابـ/ـاجـعـ الـعـلـاقـاتـ بـيـنـ الـأـشـيـاءـ وـاضـحةـ/ـتـوـقـعـ لـمـاـذـاـ وـأـوـ كـيـفـ،ـ وـادـعـ إـجـابـتـكـ بـأـدـلـةـ ذاتـ صـلـةـ.

**اقتـرحـ** **Suggest**: طـبـقـ الـمـعـرـفـةـ وـالـفـهـمـ عـلـىـ الـمـوـافـقـ الـتـيـ تـتـضـمـنـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الـإـجـابـاتـ الصـحـيـحةـ مـنـ أـجـلـ تـقـديـمـ الـمـقـترـحـاتـ.

**تنـبـأـ** **Predict**: اـقتـرحـ مـاـ قـدـ يـحـدـثـ بـنـاءـاـ عـلـىـ الـمـعـلـومـاتـ الـمـتـاحـةـ.

**حدـدـ** **Identify**: سـمـ،ـ اـخـترـ،ـ تـعـرـفـ.

**صفـ** **Describe**: قـدـمـ/ـاـذـكـرـ الـخـصـائـصـ أـوـ الـسـمـاتـ وـالـمـيـزـاتـ الـرـئـيـسـيـةـ.

**علـقـ** **Comment**: أـعـطـ رـأـيـاـ مـسـتـيـرـاـ.

**عرـفـ** **Define**: اـذـكـرـ الـمعـنـىـ الدـقـيقـ.

**قدمـ** **Give**: استـخـرـجـ إـجـابـةـ مـنـ مـصـدـرـ مـعـيـنـ أـوـ مـنـ الـذاـكـرـةـ.

**قـوـمـ** **Assess**: أـصـدـرـ حـكـمـاـ مـفـيدـاـ أـوـ مـسـتـيـرـاـ.

**قيـمـ** **Evaluate**: قـيـمـ شـيـئـاـ مـاـ،ـ أـيـ اـحـكـمـ عـلـىـ جـودـهـ،ـ أـهـمـيـتـهـ،ـ كـميـتـهـ،ـ أـوـ قـيـمـتـهـ.

**قارـنـ** **Compare**: حـدـدـ أـوـجـهـ التـشـابـهـ وـأـوـ الـاـخـتـلـافـ مـعـلـقاـ عـلـيـهـاـ.

**لـخـصـ** **Summarize**: اـخـتـرـ وـقـدـمـ النـقـاطـ الرـئـيـسـيـةـ بـدـوـنـ تـفـصـيلـ.

**ناقـشـ** **Discuss**: اـكـتـبـ بـعـقـمـ حـولـ الـمـوـضـوـعـ بـطـرـيقـةـ بـنـائـيـةـ مـنـظـمـةـ.



**التحيز Bias:** عندما يقوم الباحث، بقصد أو من دون قصد، بأخطاء منهجية في جمع العينات أو اختبار الفرضية، باختيار أو تفضيل نتيجة معينة من دون غيرها. (ص ٥٢)

**السلسل الهرمي التصنيفي Taxonomic hierarchy:** تصنيف نوع من أنواع الكائنات الحية عن طريق وصف النطاق، والمملكة، والشعبة، والطائفة، والرتبة، والعائلة، والجنس، والنوع. (ص ١٢١)

**التسمية الثنائية Binomial nomenclature:** الاسم اللاتيني لكل نوع من الكائنات الحية، يتكون من جزأين: الجنس والنوع. (ص ١٢١)

**التطفل Parasitism:** علاقة بين كائنين حيَّين حيث يستفيد المتطفل على حساب العائل. (ص ٨٨)

**التعابش Commensalism:** علاقة بين كائنين حيَّين حيث يستفيد أحد الكائنين الحيَّين في حين لا يتضرر الآخر ولا يستفيد. (ص ٨٨)

**تقييم الأثر البيئي Environmental Impact Assessment (EIA):** تقييم العواقب البيئية لخطوة، أو سياسة، أو برنامج، أو مشروع قبل اتخاذ قرار العمل به. (ص ٥٠)

**التكافُل Symbiosis:** علاقة بين كائنين حيَّين أو أكثر من أنواع مختلفة تعيش متقاربة جسمياً. (ص ٨٨)

**التكتُف Condensation:** عملية يتحول فيها الغاز إلى سائل نتيجة التبريد. (ص ٢٣)

**التكرار Frequency:** عدد مرات ظهور نوع معين (مثل النبات في عينة ما). (ص ٦٢)

**\*التلوث Pollution:** وجود أو إدخال مادة ضارة أو لها تأثيرات سامة في البيئة. على سبيل المثل الماء الملوث ضار وغير صالح للشرب. (ص ٢١)

**التماثل الخماسي Pentaradial symmetry:** خمس أذرع تتفرع من التجويفentral cavity) لجسم. (ص ١٢٩)

**التمثيل الضوئي Photosynthesis:** العملية التي تصنع النباتات من خلالها الجلوكوز باستخدام ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة من أشعة الشمس. (ص ٣٣)

**التمثيل الغذائي Assimilation:** تحول المغذي إلى شكل قابل للاستخدام يمكن دمجه في أنسجة الكائن الحي. (ص ١٠٢)

**الافتراس Predation:** تفاعل حيوي حيث يقوم كائن حي (المفترس) بقتل وأكل كائن حي آخر (فريسته). (ص ٢٦)

**الأقدام الأنبوية Tube feet:** نتوءات أنبوبية تساعده في الحركة والتغذية والتنفس. (ص ١٣٠)

**الإنتاجية Productivity:** معدل إنتاج الكتلة الحيوية لكل وحدة مساحة أو حجم لكل وحدة زمنية. (ص ٩٢)

**الإنتاجية الأولى Primary productivity:** معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة في نظام بيئي ما لكل وحدة مساحة أو حجم خلال فترة زمنية معينة، والتي تتبعها الكائنات الحية ذاتية التغذية. (ص ٩٢)

**الاتصال Blades:** تراكيب تشبه الأوراق تكون معلقة في الماء وتمتص الضوء والأملاح المعدنية. (ص ١٣٧)

**البحار Seas:** مسطحات مائية أصغر وأقل عمقاً من المحيطات، محاطة جزئياً باليابسة؛ وتكون حيث يلتقي المحيط باليابسة. (ص ١٢١)

**البيانات Data:** مجموعة من المعلومات، على شكل حقائق، أو أعداد، أو قياسات، أو إحصائيات، يمكن استخدامها للتحليل. (ص ٥١)

**البيانات الكمية Quantitative data:** بيانات عدديَّة، تبيَّن الكمية، والمدى أو مقدار متغير ما. على سبيل المثال، كمية الأمطار الشهرية. (ص ٥١)

**بيانات موثوقة Reliable data:** بيانات كاملة ودقيقة إلى حدٍ معقول، تعمل على الإجابة عن الفرضية بطريقة واضحة وشفافة ولم يتم التدخل فيها أو تعديلها بشكلٍ غير مناسب. (ص ٥٧)

**البيانات النوعية Qualitative data:** بيانات وصفية، أو غير عدديَّة. يتم جمع هذه البيانات من خلال الملاحظات، والمقابلات، ومجموعات التركيز. (ص ٥١)

**البيئة Environment:** الوسط المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي. (ص ٢٠)

**التبادل Mutualism:** علاقة بين كائنين حيَّين مختلفين حيث يستفيد كلا الكائنين الحيَّين. (ص ٨٨)

**التبخير Evaporation:** عملية يتحول فيها السائل إلى غاز. (ص ٢٢)



**الحياد الكربوني Carbon neutral**: التوازن بين كمية الكربون الذي يتم إطلاقه وكمية الكربون الذي يتم امتصاصه عبر الأنشطة المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى صافي انبعاثات صفرى في الغلاف الجوى. (ص ٣٥)

**الحيوية Biotic**: الكائنات الحية (مثل النباتات). (ص ٢٥)

**الخط الجانبي Lateral line**: قناة على الرأس وجانب السمكة تحتوى على أعضاء حسية؛ يكون مرئياً في الأسماك العظمية، إلا أنه يكون تحت الجلد في الأسماك الغضروفية. (ص ١٢٢)

**الخياشيم Gills**: سطوح تبادل الغازات في الأسماك. (ص ١٢٢)

**الدرع Carapace**: جزء من الهيكل الخارجى للقشريات يحمى الجانب الظهرى للرأس صدري. (ص ١٢٢)

**دورات المغذيات Nutrient cycles**: حركة وتبادل العناصر الضرورية للحياة من الجزيئات غير العضوية ومن خلال التثبيت، ومن ثم إلى الكائنات الحية، قبل أن تتحلل مرة أخرى إلى جزيئات غير عضوية. (ص ١٠١)

**دورة الكربون Carbon cycle**: تدفق الكربون بين مخازن الكربون المختلفة. (ص ٣٢)

**دورة الماء Water cycle**: العملية التي ينتقل فيها الماء من البحر إلى الغلاف الجوى وإلى سطح الأرض وفي جوفها ثم يعود إلى البحر. (ص ٢٢)

**ذاتي التغذية Autotrophic**: كائن حى يمكنه امتصاص طاقة الضوء أو المواد الكيميائية واستخدامها لإنتاج الكربوهيدرات من جزيئات بسيطة مثل ثانى أكسيد الكربون. (ص ٩٠)

**ذاتي التغذية الضوئية Photoautotrophs**: كائن حى يستخدم طاقة الضوء لصنع مركبات عضوية. (ص ٩٣)

**\* ذاتي التغذية الكيميائية Chemoautotroph**: كائن حى يمكنه استخدام الطاقة الكيميائية لبناء المواد العضوية. (ص ٩٤)

**الرايزومات Rhizomes**: تراكيب أفقية تحت الأرض تُمكّن الحشائش البحرية من التكاثر اللاجنسي. (ص ١٤١)

**الرَّحَلان Phoresis**: علاقة تعايش يلتصلق فيها أحد الكائنين الحيين بالكائن الحي الآخر للانتقال. (ص ٩٨)

**\* الرسم البيولوجي Biological drawing**: رسم علمي يسجل صورة عينة وأبرز سماتها. (ص ١٢٣)

**التمثيل الكيميائي Chemosynthesis**: إنتاج المركبات الكيميائية بواسطة البكتيريا أو كائنات حية أخرى باستخدام الطاقة الناتجة من التفاعلات مع مواد كيميائية غير عضوية. (ص ٩٠)

**التنبؤ Prediction**: جملة تُبيّن النتائج المتوقعة لتجربة اختبار الفرضية؛ لمعرفة ما إذا كانت الفرضية صحيحة. (ص ٥٢)

**التنفس الهوائي Aerobic respiration**: التفاعلات الكيميائية في الخلايا التي تفكك جزيئات الجلوكوز باستخدام الأكسجين وتطلق الطاقة وثاني أكسيد الكربون والماء. (ص ٣٤)

**\* التنوع البيولوجي Biodiversity**: عدد الكائنات الحية المختلفة الموجودة في النظام البيئي أو المنطقة. (ص ٢١)

**\* الثابتة Sedentary**: الكائنات التي لا تتحرك، كالنباتات أو الأنواع التي تعيش على الشواطئ الصخرية مثل البرنقيل. (ص ٦٢)

**\* ثانى أكسيد التيتانيوم Titanium dioxide**: معدن شائع يوجد في النباتات والحيوانات، وهو العنصر التاسع الأكثر شيوعاً في قشرة الأرض. وهو مسحوق أبيض يمكن تحويله إلى صبغة بيضاء ناصعة، ويُستخدم في منتجات كثيرة، منها: الطعام، والورق، والبلاستيك، والجبر، والصابون، وملونات الطعام، والكريم الواقي من الشمس. (ص ٥٠)

**الثلج البحري Marine snow**: جسيمات المواد العضوية التي تسقط من الطبقات السطحية إلى عمق المحيط. (ص ١٠٧)

**الجذر Root**: تركيب في قاعدة النبات يثبته في الركيزة ويختص المغذيات من الرواسب. (ص ١٤١)

**\* الجماعة الأحيائية Population**: مجموعة من الكائنات الحية من النوع نفسه تعيش في النظام البيئي. (ص ٢٥)

**جمع العينات العشوائية Random sampling**: جمع عينات تعتمد على سحب أسماء/أرقام على نحو عشوائي أو استخدام برنامج حاسوبي لإعطاء قائمة عشوائية. (ص ٥٨)

**جمع العينات المنتظمة Systematic sampling**: اختيار عينة بناءً على فواصل منتظمة عوضاً من الاختيار العشوائي. (ص ٥٩)

**الحراسف Scales**: صفائح رقيقة متراكبة من العظام مغطاة بالجلد والمحاطة توجد على الجزء الخارجى من السمكة. (ص ١٢٣)

- الطحالب الكبيرة** Macroalgae: منتجات بحرية، منها طحلب الكلب وعشب البحر. (ص ١٢٥)
- \***طفيل خارجي** Ectoparasite: طفيلي مثل البرغوث أو القملة يعيش على سطح العائل. (ص ٨٩)
- \***طفيل داخلي** Endoparasites: طفيلي مثل الدودة الشريطية يعيش داخل جسم العائل. (ص ٨٩)
- العامل المحدد** Limiting factor: هو العامل الذي يسبب تباطؤ نمو الجماعة الأحيائية أو تقييد حجمها (قد يستخدم مصطلح العامل المحدد أيضاً في سياقات أخرى للإشارة إلى أي عامل يمكن أن يبطئ أو يقلل من احتمال حدوث أمر ما). (ص ٢٨)
- العالق** Plankton: كائنات بحرية مجهرية تطفو بحرية. (ص ١٢٥)
- العالق الحيوانية** Zooplankton: عالق مستهلكة، وهي حيوانات إما أن تطفو أو تسبح ببطء. (ص ١٢٥)
- عينة** Sample: مجموعة من البيانات (عدد النباتات، وعدد الأنواع، وتوزيع النباتات) جُمعت من جماعة أحيائية كبيرة لقياسها. (ص ٥٤)
- الغطاء الخيشومي** Operculum: سديلة عظمية رقيقة من الجلد تغطي الخياشيم وتحميها. (ص ١٣٣)
- غير الحية** Abiotic: الأشياء غير الحية التي تؤثر على تركيب النظام البيئي مثل المناخ ونوع التربة وزاوية الانحدار. (ص ٢٥)
- غير ذاتي التغذية** Heterotrophic: كائن حي لا يستطيع صنع غذائه بنفسه، بل يتغذى على كائنات حية أخرى. جميع الحيوانات والفطريات والأولييات الحيوانية غير ذاتية التغذية، وكذلك معظم البكتيريا. (ص ٩١)
- الفرضية** Hypothesis: عبارة محددة قابلة للاختبار يُصيغها الباحث ويتبناها نتائج دراسة تم التخطيط لها للإجابة عن سؤال محدد. (ص ٥١)
- \***القارت** Omnivore: كائن حي يأكل كلّاً من اللحوم والنباتات، ويؤدي غالباً دور المستهلك الثاني. (ص ٢٨)
- \***القدرة الاستيعابية** Carrying capacity: عدد الأنواع التي يمكن أن تستوعبها منطقة معينة دون تدهور البيئة. (ص ٢٠)
- \***الرطوبة** Humidity: النسبة المئوية لبخار الماء في الهواء. (ص ٢٣)
- الرعى** Grazing: تفاعل حيوي يتغذى فيه كائن حي على النباتات مثل الأعشاب أو أوراق الأشجار أو الطحالب. (ص ٢٦)
- الزعانف** Fins: تبرز من سطح الجسم وتساعد في الحركة، والتوازن، والتكاثر، والحماية. (ص ١٣٣)
- \***زمن البقاء** Residence time: متوسط الزمن الذي يستغرقه بقاء جسيم في نظام ما. (ص ١٠٤)
- الزهرة** Flower: عضو التكاثر الجنسي في النبات. (ص ١٤٢)
- \***السبات** Hibernation: فترة زمنية يكون فيها النبات أو الحيوان في حالة سكون أو حالة غير نشطة تشبه النوم. (ص ٣١)
- الستيب** Stipe: تركيب طويل وقوى وعمودي يشبه ساق النباتات. (ص ١٣٧)
- السلسلة الغذائية** Food chain: تسلسل تغذية الكائنات الحية، ويشير إلى تدفق الطاقة، حيث يتم استهلاك أحد الأنواع من المستهلك الذي يليه، أي من المنتج عبر السلسلة إلى المفترس العلوي. (ص ٢٧)
- السنيات** Denticles: نوع من الحرافش المتداخلة التي توفر الحماية وتحسن الكفاءة الهيدروديناميكية في أسماك القرش. (ص ١٢٥)
- الشبكة الغذائية** Food web: ارتباط جميع أفراد السلالس الغذائية داخل المجتمع الأحيائي. (ص ٢٨)
- الشقوق الخيشومية** Gill slits: فتحات خارجية من الخياشيم يمكن أن يعود عبرها الماء الذي يبتلعه الفم إلى الخارج. (ص ١٣٦)
- شوكيات الجلد** Echinoderms: مجموعة من اللافقاريات البحرية أجسامها ذات تماثل خماسي ولها أقدام أنبوية. (ص ١٢٥)
- صافي الانبعاثات الصفرى** Net zero emissions: هدف التخلص التام من كمية الغازات الدفيئة الناتجة من الأنشطة البشرية وذلك عن طريق تخفيض الانبعاثات وتنفيذ طرائق لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. (ص ٣٥)
- \***طبقة المياه الجوفية** Aquifer: طبقة منفدة من الصخور تحت سطح الأرض تخزن الماء في مسام الصخر. (ص ٢٣)

**\* المجموعة الضابطة Control group:** مجموعة في الاختبار لا تتم معالجتها أو تعریضها للمتغير المستقل. تتم مقارنة نتائج هذه المجموعة بنتائج المجموعة التجريبية المستهدفة في الاختبار. (ص ٥٢)

**\* محبة للظروف القاسية Extremophile:** كائن حي متأقلم للبقاء في ظروف قاسية من درجات الحرارة أو الضغط أو الملوحة أو الرقم الهيدروجيني. (ص ٩٤)

**\* محبة للماء Hydrophilic:** مادة تجذب الماء وتحفظ به. (ص ٢٠)

**المحددات Limitations:** أوجه القصور في دراسة ما، والتي يمكن أن تؤثر على المعلومات التي يتم جمعها. تشمل المحددات تصميم البحث، والمنهجية، والمواد، والقيود الزمنية والمالية (التكليف). (ص ٥٧)

**المحيط Ocean:** كتلة متواصلة من مياه البحر على سطح الأرض، تتشكل حدودها بكتل اليابسة القارية أو تلال في قاع المحيط أو خط الاستواء. (ص ١٢١)

**المحل Decomposer:** كائن حي يقوم بتفكيك المادة العضوية. (ص ٢٨)

**\* المخاط Mucus:** مادة لزجة دقيقة تغلف السطح الذي تغطيه وتحميه وترتبه. (ص ٣١)

**المدى Range:** الفرق بين الحدود العليا والحدود الدنيا على مقياس معين (مثلاً درجة الحرارة). (ص ٣٩)

**المربع القياسي Quadrat:** إطار لجمع عينات بمساحة محددة مثلًا متر مربع ( $1\text{ m}^2$ ) واحد يتم اختيارها لتقدير التوزيع المحلي للنباتات الحيوانات. (ص ٥٩)

**المستهلك Consumer:** الكائن الحي الذي لا يستطيع إنتاج غذائه بنفسه ويجب أن يأكل كائنات حية أخرى للحصول على المغذيات. (ص ٢٨)

**المستوى الغذائي Trophic level:** مجموعة من الكائنات الحية داخل النظام البيئي تملأ المستوى نفسه داخل السلسلة الغذائية. (ص ٢٧)

**مصدر Source:** منطقة تتصف بريع صافٍ من المواد (على سبيل المثال، حيث ينتشر المزيد من الغاز في الغلاف الجوي مقارنة مع ما يذوب في المحيط). (ص ١٠٥)

**القشريات Crustaceans:** مجموعة من اللافقاريات البحرية مع هيكل خارجي صلب، وعشر أرجل مفصلية ومرحلة يرقة نوبليوس (يرقة صغيرة جدًا وشفافة). (ص ١٢٥)

**قيم شاذة Anomalies values:** بيانات غير معتادة، والتي تتحرف عن الأنماط والاتجاهات التي تشير إليها بقية البيانات. (ص ٥٥)

**الكتلة الحيوية Biomass:** إجمالي كمية المادة العضوية أو وزنها في النظام البيئي أو المواد النباتية المستخدمة كمصدر للطاقة. (ص ٢٨)

**الكريوهيدرات Carbohydrates:** مركبات عضوية توجد في الأنسجة الحية التي تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين (مثل، النشا والسليلوز والسكريات). يمكن تفكك الكريوهيدرات في عملية التنفس لإطلاق الطاقة. (ص ٨٧)

**الكلوروفيل Chlorophyll:** الصبغة الخضراء في أوراق جميع النباتات المسئولة عن امتصاص الضوء لتوفير الطاقة لعملية التمثيل الضوئي. (ص ٣٣)

**المتغير Variable:** عامل قد يتغير في النوعية أو الكمية أو الحجم بحسب فئة البيانات التي يتم قياسها (مثل هطول الأمطار). (ص ٥٣)

**المتغير المستقل Independent variable:** متغير قائم بذاته ولا يتغير بالمتغيرات الأخرى. وهو المتغير الذي يتم تغييره في التجربة لاختبار الفرضية. (ص ٥٣)

**المتغير التابع Dependent variable:** متغير يعتمد على عوامل أخرى، وهو المتغير الذي يتم قياسه خلال التجربة. (ص ٥٣)

**المتغير الضابط Control variable:** أي متغير يثبت (يبقى ثابتاً) خلال التجربة. (ص ٥٥)

**مثانة العوم Swim bladder:** عضو طفو موجود في الأسماك العظمية. (ص ١٣٤)

**المثانة الهوائية Gas bladder:** تركيب يحتوي على غاز يوفر الطفو لبعض أنواع الأعشاب البحرية. (ص ١٢٧)

**المثبت Holdfast:** تركيب قوي يشبه الجذر يثبت الطحالب الكبيرة في قاع البحر. (ص ١٣٧)

**المجتمع الأحيائي Community:** الجماعات الأحيائية المختلفة التي تعيش معاً في نظام بيئي. (ص ٢٥)



**الموطن البيئي** **Habitat**: هو المكان الذي يتخذه الكائن الحي مسكنًا له، ويلبي جميع الظروف البيئية التي يحتاج إليها للبقاء على قيد الحياة. (ص ٢٦)

**النباتات البحرية** **Marine plants**: نباتات مائية زهرية توجد غالباً في مصبّات الأنهر والبيئات الساحلية. (ص ١٢٥)

**النتح** **Transpiration**: فقدان الماء عبر أوراق النبات. (ص ٢٢)

**النسبة المئوية للتغطية** **Percentage cover**: مقياس لمدى المساحة التي يشغلها كائن حي كنسبة مئوية من منطقة محددة. (ص ٧١)

**النظام البيئي** **Ecosystem**: مجتمع أحياي من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها ومع البيئة المادية التي تعيش فيها. (ص ٢٠)

\***نظام مغلق** **Closed system**: نظام لا تتكون ولا تكتسب فيه المادة ولا تفقد. (ص ٢٢)

\***نظام مفتوح** **Open system**: نظام يمكن فيه كسب المادة أو فقدانها. (ص ٢٢)

**النظريّة العلميّة**: **Scientific theory**: تفسير لجانب من جوانب العالم الطبيعي تم اختباره مراراً وتكراراً للتحقق منه باستخدام المنهج العلمي. (ص ٥٨)

\***نوبليوس** **Nauplius**: مرحلة يرقة مميزة في القشريات. (ص ١٣١)

**النموذج** **Model**: هو نتاج تمثيل فيزيائي، أو مفاهيمي أو رياضي لحدث حقيقي صعب الملاحظة. (ص ٥٨)

\***النوع** **Species**: مجموعة من الكائنات الحية تتكون من أفراد يمكنها أن تتکاثر وتتنـج أفراداً جديدة خصبة (قادرة على الإنجاب). (ص ٢٠)

\***النوع الرئيسي** **Keystone species**: كائن له دور فريد وأساسي في طريقة عمل النظام البيئي؛ بدون الأنواع الرئيسية سيكون النظام البيئي مختلفاً على نحو كبير، أو قد يختفي من الوجود تماماً. (ص ١٢٥)

**هرم الأعداد** **Pyramid of numbers**: رسم تخطيطي يبيّن عدد الكائنات الحية في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية. (ص ٩٧)

**مصدر كربون** **Carbon source**: مخزن يطلق المزيد من الكربون إلى الغلاف الجوي مقارنة بما يخزنه. (ص ٢٥)

**مصرف** **Sink**: منطقة تتصف بفقدان صاف للمواد (على سبيل المثال، حيث يذوب المزيد من الغاز في المحيطات مقارنة مع ما ينتشر في الغلاف الجوي). (ص ١٠٥)

**مصرف كربون** **Carbon sink**: مخزن يمتص المزيد من الكربون من الغلاف الجوي مقارنة بما يطلقه. (ص ٣٥)

**المغذي** **Nutrient**: مادة كيميائية تحتاج إليها الكائنات الحية لتنمو وتصلح الخلايا والأنسجة التالفة، وإطلاق الطاقة، أو لعملية الأيض. (ص ١٠٢)

**مفتاح التشيع الثنائي** **Dichotomous key**: أداة تعرّف تستخدم سلسلة من الاختيارات لسمات مميزة بديلة، مع التوجيه إلى مرحلة أخرى في المفتاح، إلى أن يتم تحديد النوع. (ص ١٢٢)

**المفترس** **Predator**: حيوان يصطاد ويقتل وبأكل حيوانات أخرى. (ص ٩٢)

**الملاحظة** **Observation**: مراقبة، أو مشاهدة، أو الانتباه بهدف الاستقصاء العلمي. (ص ٥١)

**المنافسة بين الأنواع** **Inter-specific competition**: منافسة بين أفراد من أنواع مختلفة. (ص ٢٦)

**المنافسة داخل النوع** **Intra-specific competition**: منافسة بين أفراد النوع نفسه. (ص ٢٦)

**المنافسة** **Competition**: العلاقات بين الكائنات الحية التي تحتاج إلى المورد نفسه في المساحة نفسها. (ص ٢٦)

**المنتج** **Producer**: الكائن الحي في السلسلة الغذائية الذي ينتج غذاء من خلال عملية التمثيل الضوئي. (ص ٢٧)

**المنطقة الأحيائية** **Biome**: مجموعة من النظم البيئية المختلفة في نطاق جغرافي واسع له مناخ مماثل وغطاء نباتي سائد. (ص ٢٥)

**المنطقة الضوئية** **Photic zone**: الطبقة السطحية من المحيط التي تتلقى ضوء الشمس. (ص ٩٣)

**المنهج العلمي** **Scientific method**: إجراء يتضمن الملاحظة المنهجية، والقياس، والتجربة لاختبار الفرضيات. (ص ٥١)

**هرم الطاقة** **Pyramid of energy**: رسم تخطيطي يبيّن مقدار الطاقة الموجودة في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية. (ص ٩٩)

**هرم الكتلة الحيوية** **Pyramid of biomass**: رسم تخطيطي يبيّن الكتلة الحيوية الموجودة في كل مستوى غذائي من السلسلة الغذائية. (ص ٩٨)

**الهرم البيئي** **Ecological pyramid**: رسم يمثل العلاقة بين الكائنات الحية في مستويات غذائية مختلفة في النظام البيئي. (ص ٢٧)

**الهطول** **Precipitation**: الماء الذي يسقط على الأرض على شكل مطر، أو ثلج، أو برد، أو صقيع، أو ضباب. (ص ٢٣)

**الوفرة** **Abundance**: حساب الوفرة يعني احتساب العدد الفعلي لكتائن حي معين موجود. قد تكون الوفرة منخفضة، عندما يكون عدد الأفراد قليلاً. وتكون الوفرة كبيرة عندما يكون عدد أفراد الكائن الحي كبيراً. (ص ٧١)

**الورقة** **Leaf**: عضو التمثيل الضوئي في النباتات. (ص ١٤١)

**\*اليرقات** **Larvae**: مرحلة عوالقية من التطور تحدث بين مرحلتي البيضة واليافعة؛ توجد تقريباً في جميع أنواع الأسماك واللافقاريات. (ص ١٢٨)



## شكر وتقدير

يتوجه المؤلفون والناشرون بالشكر الجزيل إلى جميع من منحهم حقوق استخدام مصادرهم أو مراجعهم. وبالرغم من رغبتهم في الإعراب عن تقديرهم لكل جهد تم بذله، وذكر كل مصدر تم استخدامه لإنجاز هذا العمل، إلا أنه يستحيل ذكرها وحصرها جميعاً. وفي حال إغفالهم لأي مصدر أو مرجع فإنه يسرهم ذكره في النسخ القادمة من هذا الكتاب.

©Artur Debat/GI, Thorsten Milse / robertharding/GI, Ron Sanford/GI, Ashley Cooper/GI, ugurhan/GI, Ghislain & Marie David de Lossy/GI, Anup Shah/GI, Martin Harvey/GI, Images from BarbAnna/GI, maiteali/GI, Ana Rocio Garcia Franco/GI, Darrell Gulin/GI, Pakin Songmor/GI, koiguo/GI, Jose A. Bernat Bacete/GI, bjdlzx/GI, sinology/GI, slava296/Shutterstock.com, Anup Shah/GI, Lou Coetzer/GI, Wolfgang Filser/GI, Greenshoots Communications/Alamy Stock Photo, Nitat Termmee/GI, tdub303/GI, Oman Ministry of Education, ^Martin Harvey/GI, Berkah/GI, Simon Landolt/GI, Giordano Cipriani/GI, somnuk krobkum/GI, monticelllo/GI, Ralf Pollack/GI, kampee patisena/GI, PixeloneStocker/GI, 'Robomussle' photo by Adam Glanzman/Northeastern University, DSV Limiting Factor from the image gallery on the Deep Fives website <https://fivedeeps.com/home/media/galleries/trials-testing-media/>, Xavier Hoenner Photography/GI, BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY, by wildestanimal/GI, Paulo Oliveira / Alamy Stock Photo, Jeff Rotman/GI, scubaluna/GI, Jeff Rotman/GI, DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY/GI, Pete Atkinson/GI, Paule858/GI, Yva Momatiuk & John Eastcott/GI, Buck Shreck/GI, DR KEN MACDONALD/SCIENCE PHOTO LIBRARY, Shur\_ca/GI, Joost van Uffelen/GI, DEA/F. BALLANTI/GI, A. Martin UW Photography/GI, Oxford Scientific/GI, Sinhyu/GI, WIM VAN EGMOND/SCIENCE PHOTO LIBRARY, Roland Birke/GI, Alexander Semenov/GI, Karen Gowlett-Holmes/GI, DeAgostini/GI, Peter Johnson/Corbis/VCG/GI, Auscape/Universal Images Group/GI, Carlo Pinasco/GI, Jeff Rotman/GI, Cedric Favero/GI, Douglas Klug/GI, photo by Farley Baricuatro ([www.colloidfarl.blogspot.com](http://www.colloidfarl.blogspot.com))/GI, A. DEMOTES/GI, Image Source/GI, A Mokhtari/GI, Oxford Scientific/GI

GI = Getty Images

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# العلوم البيئية - كتاب الطالب

تم تصميم كتاب الطالب ليستخدمه بتوجيه من المعلم. تحتوي الوحدات على تفسيرات وتحريفات وأسئلة ودراسة حالات وأمثلة عملية ومجموعة من الميزات الأخرى لإشراك الطلبة في استيعاب المعلومة وفهمها بأساليب منهجية جاذبة. كما تتيح لهم فرصة كثيرة للمشاركة في نقاشات هادفة، والعمل بشكل فردي أو ثنائي أو مع المجموعة.

- بعض الميزات مثل «قبل أن تبدأ بدراسة الوحدة»، والملخصات، وكيفية التعلم النشط، وبناء المهارات، تمنح فرصة للتفكير.
- تدعم «العلوم البيئية ضمن سياقها»، تفسير الأفكار ضمن سياق العالم الواقعي، وتحفز مناقشة المفاهيم مع الطلبة الآخرين.
- تتيح دراسة حالة ودراسة حالة موسعة والأسئلة المصاحبة لها استكشاف حالات واقعية في إدارة البيئة بشكل فعال. كما تتيح للطلبة فرصة للعمل بشكل فردي، أو ثنائي أو ضمن مجموعات.
- تساعد أسئلة موضوعات الوحدات، والأمثلة المصاحبة والتمثيلات البيانية والصور والأشكال على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين.
- تشجع الأسئلة ذات الجزئيات المتعددة الموجودة في نهاية كل وحدة على التحضير لأداء الامتحانات بثقة.

يشمل منهج العلوم البيئية للصف الحادي عشر من هذه السلسلة أيضاً:

- كتاب التجارب العملية والأنشطة
- دليل المعلم